

# Disudrin-ped

## Pseudoephedrine HCl

Sirup 15 mg/5 mL

- Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain (misal: efedrin, fenilpropanolamin HCl, fenilefrin), penderita tekanan darah tinggi berat, dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase (MAO).
- Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan.
- Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau *stroke*, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih (*overweight*) atau penderita usia lanjut.
- Bila dalam 3 hari gejala-gejala tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan.
- Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing.

### KOMPOSISI

Setiap 5 mL (1 sendok takar) mengandung

Pseudoephedrine HCl ..... 15 mg

### INDIKASI

Meringankan bersin-bersin dan hidung tersumbat karena pilek.

### CARA KERJA OBAT

Bekerja sebagai dekongestan hidung.

### DOSIS DAN CARA PEMBERIAN

Diberikan 3 kali sehari sesuai dengan ketentuan berikut:

- 2 - 5 tahun ..... 2,5 mL (1/2 sendok takar)  
atau sesuai petunjuk dokter.

### KONTRAINDIKASI

- Lihat kotak peringatan.
- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini.

### PERINGATAN & PERHATIAN

- Lihat kotak peringatan
- Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, retensi urin, gangguan fungsi jantung, dan diabetes melitus.
- Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 2 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter.

### EFEK SAMPING

Gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih.

### INTERAKSI OBAT

Penggunaan bersamaan antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi.

**DAFTAR EKSIPIEN**

Sorbitol, Purified Water, Sucrose, Glycerin, Sodium Citrate, Citric Acid, Orange Flavour, Saccharin Sodium, Sodium Benzoate, FDC Yellow #6

**KEMASAN**

Dus isi 1 botol @ 60 mL

No. Reg.: DTL2104530637A1

SIMPAN PADA SUHU DIBAWAH 30°C, TERLINDUNG DARI CAHAYA  
JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK  
KOCOK DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN

Disudrin-ped Sirup tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari setelah botol dibuka.

**P.No.1**  
**Awas! Obat Keras**  
**Bacalah Aturan Pemakaiannya**

Diproduksi oleh:

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk  
Gunung Putri, Bogor, Indonesia

Dipasarkan oleh:



# Disudrin-ped

## Pseudoephedrine HCl

Syrup 15 mg/5 mL

- Should not be administered to patients with known hypersensitivity to other sympathomimetic drugs (i.e. ephedrine, phenylpropanolamine HCl, phenylephrine), patients with severe hypertension, and patients receiving antidepressant therapy like monoamine oxidase (MAO) inhibitors.
- Do not exceed the recommended dosage.
- Use with caution in hypertensive patients or those who are potentially predisposed to hypertension or stroke, such as overweight or geriatric patients.
- If symptoms persist within 3 days, consult your physician or medical service unit.
- Stop using this medicine in case of insomnia, palpitation or headache.

### COMPOSITION

Each 5 mL (1 measuring spoon) contains

Pseudoephedrine HCl ..... 15 mg

### INDICATIONS

Relieves common cold symptoms, such as sneezing and nasal congestion/stuffiness.

### ACTION

Work as a nasal decongestant.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION

Administered 3 times in a day with the following conditions:

- 2 - 5 years ..... 2.5 mL (1/2 measuring spoon)
- or, as directed by a doctor.

### CONTRAINDICATIONS

- See warning box
- Patients with hypersensitivity to the component of this medicine.

### PRECAUTIONS

- See warning box.
- Caution to patients with liver and kidney function problem, glaucoma, prostate hypertrophy, hyperthyroidism, urine retention, heart dysfunction, and diabetes mellitus.
- Should not be used for children under 2 years, pregnant and lactating women, unless advised by the doctor.

### SIDE EFFECT

Metabolism dysfunction, headache, insomnia, excitation, tremor, tachycardia, arrhythmia, dry mouth, palpitation, urinary obstruction.

### DRUG INTERACTION

The usage with antidepressant type MAO inhibitor can caused hypertension crisis.

**LIST OF EXCIPIENT(S)**

Sorbitol, Purified Water, Sucrose, Glycerin, Sodium Citrate, Citric Acid, Orange Flavour, Saccharin Sodium, Sodium Benzoate, FDC Yellow #6

**PRESENTATION**

Box of 1 Bottle @ 60 mL

Reg. No.: DTL2104530637A1

STORE AT TEMPERATURE BELOW 30°C PROTECT FROM LIGHT

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

SHAKE WELL BEFORE USE

Disudrin-ped Syrup may not be used more than 30 days after the bottle is opened.

**P.No.1**  
**Awas! Obat Keras**  
**Bacalah Aturan Pemakaiannya**

Manufactured by:

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Gunung Putri, Bogor, Indonesia

Marketed by:

