

VAKSIN JERAP DT

DESKRIPSI

Vaksin DT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid Tetanus dan toksoid Difteri yang telah dimurnikan yang teradsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Satu dosis vaksin mengandung potensi sedikitnya 30 IU (*Internasional Units*) untuk difteri dan 40 IU untuk tetanus toksoid. Vaksin Jerap DT merupakan suspensi untuk injeksi.

KOMPOSISI

Tiap dosis (0,5 mL) mengandung:

Zat berkhasiat:	
Difteri toksoid murni	20 Lf
Tetanus toksoid murni	7,5 Lf
Zat tambahan:	
Aluminium Fosfat	1,5 mg
Thimerosal	0,05 mg

INDIKASI

Imunisasi aktif terhadap difteri dan tetanus secara simultan pada anak-anak.

CARA KERJA OBAT

Merangsang tubuh membentuk antibodi terhadap difteri dan tetanus.

POSOLOGI

Vaksin DT direkomendasikan untuk digunakan pada imunisasi anak-anak usia dibawah 7 tahun, terutama jika terjadi kontraindikasi terhadap komponen pertusis pada vaksinasi DTP. Imunisasi primer untuk anak terdiri dari tiga dosis 0,5 mL disuntikkan secara intramukular. Suntikan pertama dan kedua dengan masa antara 4-6 minggu, suntikan ketiga 6 bulan kemudian.

DT dapat diberikan bersamaan dengan vaksin BCG, Campak, Rubella, Mumps, Polio (OPV dan IPV), Hepatitis B, Hib, dan Yellow fever.

Vaksin harus disuntikkan secara intramuskular, setiap penyuntikan harus menggunakan syringe steril.

Dapat digunakan sebagai booster pada usia pra sekolah dan sekolah.

EFEK SAMPING

Sakit dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara, guillane bare syndrome dan kadang-kadang demam.

KONTRAINDIKASI

- Dosis kedua DT jangan diberikan apabila anak menderita reaksi berat terhadap dosis sebelumnya.
- Hipersensitif terhadap salah satu komponen dari vaksin.

Immuno-Defisiensi

Individu yang terinfeksi HIV *symptomatic* maupun *asymptomatic*, harus divaksinasi DT menurut jadwal yang telah ditetapkan.

INTERAKSI OBAT

Tidak ada

PERINGATAN DAN PERHATIAN


- Vaksin harus dikocok sebelum digunakan untuk menghomogenkan suspensi.
- Untuk individu berusia 8 tahun atau lebih, direkomendasikan vaksin jerap khusus untuk dewasa yaitu vaksin Td.
- Harus diberikan secara hati-hati kepada individu yang mempunyai riwayat penyakit alergi dan riwayat *convulsion*. Larutan adrenalin 1 : 1.000 harus selalu tersedia untuk penanganan segera terhadap reaksi anafilaktik.
- Sebelum vaksin digunakan, informasi pada gambar *Vaccine Vial Monitor (VVM)* agar diikuti.

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu antara +2°C dan +8°C. JANGAN DIBEKUKAN. Lindungi terhadap cahaya matahari.

KEMASAN

Dus, 10 vial @ 5 mL (10 dosis): Reg. No.: GKL8502901643A1



Vaccine Vial Monitor (VVMs) merupakan bagian dari etiket vaksin DT berbentuk noktah berwarna, yang sensitif terhadap suhu (time- temperature sensitive) dan berfungsi sebagai indikator adanya akumulasi paparan panas yang dialami oleh vial (vaksin). Hal tersebut merupakan petunjuk bagi pemakai apakah vaksin masih dapat digunakan atau tidak.

Pembacaan VVM mudah. Fokuskan pada kotak yang berada di tengah lingkaran. Warnanya akan berubah secara bertahap. Selama warna kotak tersebut lebih muda daripada bagian lingkaran maka vaksin masih bisa digunakan. Jika warna kotak tersebut sama atau lebih gelap daripada bagian lingkaran, maka vaksin harus segera dibuang.

Harus Dengan Resep Dokter

Diproduksi oleh: PT Bio Farma (Persero)
 Jl. Pasteur no. 28 - Bandung 40161 - INDONESIA
 PO Box 1136, Tel. +62 22 2033755, Fax. +62 22 2041306
www.biofarma.co.id
 Edisi: 020521-DT

GTIN:08994957000690

**WAKSIN DT**

	Manufactured	: PT Bio Farma (Persero)	Final folding dimension	: 100 x 35 mm
	Address	: Jl. Pasteur No 28 Bandung 40161	Folding	: 3x fold
	Product	: Leaflet Vaksin DT 1 Bahasa Indonesia	Color	: 2 Color
	Material	: HVS 70 gsm	 PMS Black U  PMS Lime 367 U	
	Dimension	: 100 x 280 mm, ± 2 mm		
	Scale	: 100 %		
	Edition	: 020521-DT		
Note	:			