# Bioplacenton®
# Ekstrak plasenta, Neomycin sulfate
**jelly**

**Komposisi**
Tiap gram jelly mengandung:
Ekstrak plasenta ..... 10 %
Neomycin sulfate ..... 0,5 %
*Jelly base* ..... q.s.
Bahan tambahan: *Purified Water*, *Methylparaben*, *Propylparaben*, *Glycerol*, *Essence Narcisse*, *Hydroxyethylmethylcellulose*.

**Pemerian**
Sedikit buram hingga buram kekuningan, semisolid (gel), massa halus dan homogen, diisi dalam 15 gram tube.

**Farmakologi**
Ekstrak plasenta mengandung stimulator biogenik yang mempunyai aksi stimulasi pada proses metabolik di dalam sel. Efek stimulasi ini telah ditunjukkan dalam studi *in vitro* dan *in vivo* seperti peningkatan konsumsi oksigen di dalam sel hati, peningkatan regenerasi sel, dan penyembuhan luka.
*Neomycin sulfate* merupakan antibiotik topikal dengan potensi yang tinggi terhadap banyak strain bakteri Gram positif dan Gram negatif.

**Indikasi**
**BIOPLACENTON®** diindikasikan untuk penyembuhan luka bakar, luka terinfeksi, scald, dan ulkus kulit.

**Kontraindikasi**
Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap berbagai komponen dalam **BIOPLACENTON®**.

**Dosis dan Cara Pemberian**
Aplikasikan jeli dalam jumlah yang cukup pada permukaan luka, 3-5 kali sehari sesuai kebutuhan.

**Peringatan dan Perhatian**
- Hentikan penggunaan jika terjadi sensitisasi.
- Penggunaan *neomycin sulfate* untuk periode yang lama dapat menyebabkan infeksi sekunder (misalnya infeksi jamur).
- Jangan gunakan **BIOPLACENTON®** pada mata atau kulit di sekitar mata.
- Obat ini hanya digunakan selama kehamilan atau menyusui jika benar-benar dibutuhkan.

**Interaksi Obat**
**BIOPLACENTON®** jangan digunakan dengan *aminoglycoside* lainnya atau penghambat neuromuskuler dalam kondisi di mana dapat terjadi absorpsi sistemik yang bermakna (misalnya aplikasi pada luka bakar atau kulit yang terluka, penggunaan dalam jumlah yang besar, atau pada daerah yang luas dalam waktu yang lama).

**Efek Samping**
Neomycin dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Setelah penggunaan pada luka bakar yang luas, dapat terjadi nefrotoksisitas dan/atau ototoksisitas, khususnya pada pasien dengan gangguan ginjal atau jika diberikan bersama dengan obat nefrotoksik dan/atau ototoksik lainnya.


DISETUJUI OLEH BPOM: 17/07/2024 ID: EREG100221VR12400020

**Penyimpanan**
Simpan di bawah suhu 30°C.
Lindungi dari panas.

**Kemasan**
Tube 15 gram
No. Reg. DKL7211638828A1

**HARUS DENGAN RESEP DOKTER.**

**PT KALBE FARMA**
**Bekasi - Indonesia**


DISETUJUI OLEH BPOM: 17/07/2024 ID: EREG100221VR12400020