Komposisi : Setiap kaplet mengandung Paracetamol 500 mg, Phenylephrine HCl 5 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg.

Cara kerja Obat : Bekerja sebagai analgesik-antipiretik, nasal decongestan, dan antitusif.

Indikasi : Untuk meredakan gejala-gejala flu seperti : demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk tidak berdahak.

Dosis dan Aturan Pakai : Dewasa : 1 kaplet 3 x sehari, jangan melebihi 8 kaplet dalam tiap jangka waktu 24 jam. Jangan diberikan kepada anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali atas petunjuk dokter.

Peringatan dan Perhatian : Lihat Box Warning . Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertiroid, prostat, hipertensi, dan retensi urin. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Tidak dianjurkan penggunaan bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol. Penggunaan pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Hati-hati untuk penderita dalam keadaan mengantuk, cebil, dan hipoksia (kekurangan oksigen). Cegah menyebabkan depresi pernapasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernapasan (misal : asma, emfisema). Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Efek Samping : Kadang-kadang dapat menyebabkan takykardia (jantung berdebar), dyspepsia, nausea, kemerahan pada kulit, depresi pernapasan dan susunan saraf pusat, mengantuk, konstipasi, mual, pusing, gangguan saluran pencernaan, insomnia, gelisah, ekstasi, tremor. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati.

Interaksi Obat : Penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat Monoamin oksidase (MAOIs) dapat mengakibatkan krisis hipertensi.

Kontraindikasi : Lihat Box Warning. Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat, gangguan jantung, dan diabetes mellitus.

- Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain (misal: ephedrine, pseudoephedrine, phenylpropanolamine), penderita tekanan darah tinggi berat, dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat Monoamin oksidase (MAO).
- Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan.
- Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih (*overweight*) atau penderita usia lanjut.
- Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan.
- Hentikan pengunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing.

SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT, DAN DI BAWAH 30°C.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak

No. Reg. DTL1124503604A1.

Diproduksi oleh:

PT Sterling Products Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Trade Marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.
©2024 Haleon group of companies or its licensor.

BPOM RI

P. No 1
Aman Obat Keras
Bacalah aturan pemakaian

8 992695190208

62000000074817 0722

HET, No. Bets, Tanggal Produksi, dan Batas Kedaluwarsa lihat di blister

124

56

12

112

113

9.9 18 9.9

4 8

DISETUJUI OLEH BPOM : 06/05/2024

ID : EREG100273VR12400025