



# LEAFLET ANDANTOL GEL 10g

FRONT

BACK

## Andantol<sup>®</sup> Gel Isothipendyl HCl Antihistamine



### KOMPOSISI

Tiap gram mengandung:  
Isothipendyl HCl 7,5 mg dalam basis gel yang tidak berminyak.

### BAHAN TAMBAHAN

Potassium Sorbate, Edetate Disodium, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Hydroxide, Sorbitol Solution 70% (Non Crystalline).

### CARA KERJA

Sebagai Antihistamin.

### INDIKASI

Untuk meringankan gejala-gejala alergi seperti gatal-gatal, urtikaria dan alergi gigitan serangga.

### PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Hindarkan kontak dengan mata atau membrane mukosa lainnya.
- Hentikan penggunaan jika terjadi rasa terbakar atau ruam.
- Jangan digunakan pada saat cacar air atau morbili.
- Pemakaian yang terus menerus dapat menyebabkan iritasi.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

### EFEK SAMPING

Pada pasien yang hipersensitif terhadap Isothipendyl HCl dapat timbul reaksi sensitivitas pada kulit.

### KONTRAINDIKASI

Pasien hipersensitif terhadap Isothipendyl HCl dan turunannya.

### DOSIS DAN CARA PENGGUNAAN

Dioleskan secukupnya 3 kali sehari pada tempat yang sakit.

### KEMASAN

Box, Tube 10 g  
No. Reg. DKL 1732209528A1

Simpan di bawah 25°C, di tempat kering dan sejuk.  
Segera digunakan setelah kemasan dibuka, tidak lebih dari 3 bulan setelah kemasan dibuka.

### HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Batas kedaluarsa: 36 bulan

Diproduksi oleh:

 **PT. MENARINI INDRIA LABORATORIES**  
MENARINI Bekasi – Indonesia

Dipasarkan oleh:

PT. Transfarma Medica Indah, Jakarta - Indonesia

packcode

## Andantol<sup>®</sup> Gel Isothipendyl HCl Antihistamine



### COMPOSITION

Each gram contains:  
Isothipendyl HCl 7.5 mg in a non greasy gel-base.

### EXCIPIENTS

Potassium Sorbate, Edetate Disodium, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Hydroxide, Sorbitol Solution 70% (Non Crystalline).

### MODE OF ACTION

Antihistamine.

### INDICATIONS

To reduce allergic symptoms like itching, urticarial and allergy caused by insect bites.

### WARNING AND PRECAUTIONS

- Avoid contact with the eyes or other mucous membranes.
- Stop using if it makes burning sensation or efflorescence.
- Should not be applied during chicken pox or morbili.
- Prolonged use may cause skin irritation.
- Store drug out reach of children.

### SIDE EFFECTS

Patients hypersensitive to Isothipendyl HCl may have skin sensitization.

### CONTRAINDICATIONS

Patients hypersensitive to Isothipendyl HCl and its derivatives.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION

To be sparingly applied three times daily to affected part of the skin.

### PRESENTATION

Box, Tube 10 g  
Reg. No. DKL1732209528A1

Store below 25°C, in a dry and cool place.  
It is used immediately after the packaging is opened, no later than 3 months after the packaging is opened.

### ON MEDICAL PRESCRIPTION ONLY

Shelf life : 36 months

Manufactured by:

 **PT. MENARINI INDRIA LABORATORIES**  
MENARINI Bekasi - Indonesia

Marketed by:

PT. Transfarma Medica Indah, Jakarta - Indonesia

packcode

COLOR GUIDE

BLACK C