



INFORMASI UNTUK PASIEN

Zovirax Krim
Aciclovir

Baca keseluruhan brosur ini secara teliti sebelum Anda mulai menggunakan obat ini karena mengandung informasi penting untuk Anda.

- Simpan brosur ini. Anda mungkin perlu membacanya kembali.
- Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, tanyakan pada dokter, perawat atau apoteker.
- Obat ini hanya diresepkan untuk Anda. Jangan diberikan kepada orang lain. Hal tersebut dapat membahayakan mereka, meskipun gejala penyakit mereka sama dengan gejala Anda.
- Jika Anda merasakan efek samping, konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Hal ini termasuk kemungkinan efek samping lain yang tidak tertulis dalam brosur ini. Lihat *Bagian 4*.

Apa saja yang ada dalam brosur ini:

1. Apa itu *Zovirax* dan digunakan untuk apa
2. Apa yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan *Zovirax*
3. Cara menggunakan *Zovirax*
4. Efek samping yang mungkin terjadi
5. Cara penyimpanan *Zovirax*
6. Isi dari kemasan dan informasi lain

1. Apa itu *Zovirax* dan digunakan untuk apa

Zovirax Krim (disebut '*Zovirax*' pada brosur ini) mengandung zat aktif yang disebut aciclovir. Obat ini termasuk dalam golongan antivirus. Obat ini digunakan untuk mengobati luka pada kulit termasuk infeksi kelamin yang disebabkan oleh *Herpes simplex*. Obat ini bekerja dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan virus yang menyebabkan luka atau herpes pada kelamin.

2. Apa yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan *Zovirax***Jangan gunakan *Zovirax* apabila:**

- Anda alergi (hipersensitif) terhadap aciclovir, valaciclovir, propylene glycol atau kandungan lain (disebutkan pada *Bagian 6*).

Jika Anda tidak yakin, tanyakan pada dokter atau apoteker Anda sebelum menggunakan *Zovirax*.

Perhatian dan pencegahan

Konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda sebelum menggunakan *Zovirax* apabila:

- Anda memiliki kondisi dimana sistem imun Anda kurang baik dan tubuh Anda tidak mampu melawan infeksi (contohnya apabila Anda mengidap HIV/AIDS atau apabila Anda baru saja menjalani tindakan transplantasi sumsum tulang).

Jika Anda tidak yakin, tanyakan pada dokter atau apoteker Anda sebelum menggunakan *Zovirax*.

Zovirax Krim tidak untuk digunakan pada mulut, mata atau pada vagina. *Zovirax Krim* dapat menyebabkan iritasi kulit.

Jika Anda tidak yakin, tanyakan pada dokter atau apoteker Anda sebelum menggunakan *Zovirax*.

Obat lain dan *Zovirax*

Konsultasikan dengan dokter atau apoteker apabila Anda sedang menggunakan, atau akhir-akhir ini menggunakan obat lain. Hal ini mencakup obat-obatan tanpa resep, termasuk obat herbal.

Kehamilan dan menyusui

Konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan *Zovirax*.

***Zovirax* mengandung:**

Cetostearyl alcohol; Zat tambahan *cetostearyl alcohol* dapat menyebabkan reaksi kulit lokal (misalnya dermatitis kontak).

Propylene glycol; Pada tiap gram obat ini mengandung 400 mg *propylene glycol*.

Propylene glycol dapat menyebabkan iritasi kulit. Jangan gunakan obat ini pada bayi berumur kurang dari 4 minggu dengan luka terbuka atau pada area besar dari kulit yang rusak (seperti terbakar) tanpa konsultasi dengan dokter atau apoteker.

Sodium laurilsulfate; Pada tiap gram obat ini mengandung 7.5 mg *sodium laurilsulfate*.

Sodium laurilsulfate dapat menyebabkan reaksi kulit lokal (seperti sensasi tersengat atau terbakar) atau dapat meningkatkan reaksi kulit yang disebabkan oleh produk lain ketika dioleskan pada area yang sama.

3. Cara Menggunakan Zovirax

Selalu gunakan obat ini sesuai saran dokter kepada Anda. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker apabila Anda tidak yakin.

Penggunaan obat ini

- *Zovirax Krim* tidak untuk digunakan pada mulut, mata atau pada vagina.
- *Zovirax* tidak untuk dicampur dengan zat apapun sebelum digunakan, termasuk air.
- Pastikan Anda mencuci tangan sebelum dan setelah mengoleskan *Zovirax Krim*.

Dewasa dan anak-anak

- Oleskan krim tipis-tipis pada area yang terinfeksi lima kali sehari.
- Anda harus memberikan jeda waktu oles *Zovirax* setidaknya 4 jam. Waktu yang dianjurkan: pukul **07.00, 11.00, 15.00, 19.00, dan 23.00**.
- Apabila luka atau herpes kelamin tidak membaik setelah 5 hari, maka lanjutkan pemakaian *Zovirax* selama 5 hari berikutnya.
- Apabila area yang terinfeksi masih belum sembuh setelahnya, hentikan penggunaan krim dan konsultasikan pada dokter.

Apabila Anda menggunakan Zovirax lebih dari yang seharusnya

Konsultasikan dengan dokter atau apoteker apabila Anda terlalu banyak menggunakan *Zovirax*. *Zovirax Krim* hanya untuk digunakan pada kulit, apabila tidak sengaja tertelan, segera konsultasikan pada dokter atau apoteker.

Apabila Anda terlewat menggunakan Zovirax

- Jika Anda terlewat untuk menggunakan *Zovirax*, segera oleskan setelah Anda ingat. Apabila waktu penggunaan selanjutnya sudah dekat, abaikan waktu yang terlewat.
- Jangan lakukan dua kali pengolesan untuk menggantikan dosis yang terlewatkan.

4. Efek samping yang mungkin terjadi

Seperti semua obat-obatan, *Zovirax* dapat menyebabkan efek samping, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Berikut efek samping yang mungkin terjadi dengan obat ini:

Reaksi alergi (terjadi pada kurang dari 1 dari 10.000 orang)

Apabila Anda mengalami reaksi alergi, **hentikan penggunaan Zovirax dan segera konsultasikan dengan dokter**. Gejalanya meliputi

- kemerahan, gatal atau ruam pada kulit,
- bengkak pada wajah, mulut, lidah atau anggota tubuh yang lain,
- sesak napas, mengi atau pernapasan terganggu,
- demam yang tidak diketahui penyebabnya, merasa ingin pingsan terutama saat posisi berdiri.

Efek samping lain termasuk

Tidak Sering (terjadi pada hingga 1 dari 1.000 orang)

- rasa terbakar atau tersengat setelah mengoleskan krim yang kemudian hilang setelahnya,
- kulit kering atau mengelupas,
- gatal.

Jarang (terjadi pada hingga 1 dari 10.000 orang)

- kemerahan pada kulit,
- dermatitis kontak.

Jika efek samping menjadi serius atau Anda mengalami efek samping yang tidak tertulis pada brosur ini, segera konsultasikan pada dokter atau apoteker.

Pelaporan efek samping

Jika Anda merasakan efek samping, harap konsultasikan ke dokter atau apoteker. Termasuk kemungkinan efek samping lain yang tidak tertulis dalam brosur ini. Dengan melaporkan efek samping, Anda dapat membantu memberikan informasi lebih terhadap keamanan obat ini.

5. Bagaimana cara penyimpanan Zovirax

- Simpan obat ini jauh dari penglihatan dan jangkauan anak-anak.
- Simpan pada suhu di bawah 30°C.
- Jangan disimpan dalam lemari pendingin.
- Jangan gunakan *Zovirax* setelah tanggal kedaluwarsa yang tertulis pada karton dan *tube*. Tanggal kedaluwarsa merujuk pada hari terakhir bulan tersebut.
- Jangan membuang obat apapun di air limbah atau limbah rumah tangga. Tanyakan pada apoteker bagaimana membuang obat yang tidak digunakan lagi. Langkah ini membantu dalam menjaga lingkungan.

6. Isi dari kemasan dan informasi lain

Kandungan pada Zovirax Krim

- Bahan aktif adalah aciclovir.
- Krim mengandung 5% w/w aciclovir.
- Komponen lainnya adalah *poloxamer 407, cetostearyl alcohol, sodium laurilsulfate, white soft paraffin, liquid paraffin, propylene glycol, purified water, glycerol monostearate* dan *polyoxyethylene stearate (arlacel), dimeticone 20*.

Bagaimana bentuk Zovirax dan isi kemasan

Tiap karton berisi satu *tube* 5 g krim *Zovirax*. *Tube* dikemas dengan tutup berulir dan berisi krim lembut berwarna putih pucat.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Zovirax Krim 5 g Reg. No. DKL1632005529A1

Diproduksi oleh:

PT Sterling Products Indonesia
Jakarta, Indonesia

Untuk:

PT Glaxo Wellcome Indonesia
Jakarta, Indonesia

Merek dagang dimiliki oleh atau dilisensikan kepada grup perusahaan GSK.
©2024 grup perusahaan GSK atau pemberi lisensinya.

Version number : 01
Reference : Version 1 – Aug 2023
Date of local revision : 6 Jan 2024