

Krim Pi Kang Shuang
Triamcinolone Acetonide Acetate, Miconazole Nitrate, Neomycin Sulfate
Krim Topikal

PEMERIAN

Putih susu dengan basis krim, tidak berbau

KOMPOSISI

Tiap gram mengandung :

Triamcinolone Acetonide Acetate..... 1 mg
Miconazole Nitrate..... 10 mg
Neomycine Sulfate..... 4,6 mg

DAFTAR EKSIPIEN

- Propylene Glycol
- White Vaseline
- Polyoxyl 20 Cetostearyl Ether (Cetareth-20)
- Ethylparaben
- Isopropyl Palmitate
- Stearyl Alcohol
- Glyceryl Monostearate
- Polyethylene Glycol 400 (Macrogol 400)
- Purified Water

FARMAKOLOGI

Produk ini mengandung Miconazole Nitrate sebagai anti jamur dengan spektrum luas, Triamcinolone Acetonide Acetate merupakan golongan glucokortikoid sebagai anti inflamasi, anti pruritis dan anti alergi serta Neomycin Sulfate yang mempunyai efek anti bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.

INDIKASI

Meringankan inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid yang disertai infeksi jamur dan bakteri.

KONTRA INDIKASI

Hipersensitivitas terhadap Triamcinolone Acetonide Acetate, Miconazole Nitrate dan Neomycine Sulfate.

EFEK SAMPING

1. Reaksi alergi yang mungkin terjadi
2. Efek samping rasa terbakar, gatal, iritasi dan eritema pernah terjadi
3. Penggunaan jangka panjang kadang-kadang menyebabkan atrofi kulit lokal, pigmentasi dan berbulu

PERHATIAN DAN PERINGATAN

1. Hindari bersentuhan dengan mata dan mukosa membran (seperti mulut dan hidung)
2. Jika terjadi rasa terbakar, merah dan bengkak pada area kulit yang terkena krim, hentikan penggunaan dan segera cuci krim dari kulit. Konsultasikan dengan dokter bila perlu.
3. Pasien dengan hipertensi, penyakit liver, osteoporosis, disfungsi hati harus hati-hati menggunakan krim ini.
4. Gunakan produk ini di bawah instruksi dokter selama kehamilan dan untuk ibu menyusui.
5. Tidak direkomendasikan digunakan pada seluruh permukaan tubuh atau untuk penggunaan jangka panjang.
6. Jangan digunakan lebih dari 1 minggu. Jika gejala tetap terjadi, konsultasikan dengan dokter.
7. Jangan digunakan pada pasien dengan alergi obat ini.
8. Jangan digunakan bila ada perubahan pada produk.
9. Silakan konsultasi dengan dokter atau apoteker, bila produk ini digunakan bersamaan dengan obat lain.

DOSIS DAN ATURAN PAKAI

Olehkan secara tipis krim ini pada permukaan kulit yang sakit 2 atau 3 kali sehari, maksimum pemakaian selama 1 (satu) minggu, bila tidak ada perubahan agar segera dikonsultasikan dengan dokter.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER
HANYA UNTUK PEMAKAIAN LUAR

KEMASAN

Dus, Tube @ 5 g
No. Reg: DKL1842200229A1

PENYIMPANAN

Simpan di tempat kering di bawah suhu 30 oC

Diproduksi oleh: PT. Sano Gratia Farma
Bekasi - Indonesia

105,0 mm

100,0 mm