

BORRAGINOL[®] - S SUPPOSITORIES

EXTRACT OF LITHOSPERMI RADIX

PREDNISOLONE

LIDOCAINE

ETHYL AMINOBENZOATE

CETRIMIDE

ANTIHEMORRHOIDAL

BORRAGINOL-S Suppository is a therapeutic agent for hemorrhoids. It alleviates inflammation, itching, edema, pain and allergic symptoms and promotes healing.

Composition:

Each suppository contains:

Extract of Lithospermi Radix	0.18 mg
Prednisolone	1 mg
Lidocaine	15 mg
Ethyl Aminobenzoate	20 mg
Cetrimide	2.5 mg

Action:

It has prompt antiphlogistic, analgesic, antiseptic, antipruritic and hemostatic actions in hemorrhoids, hemorrhoidal bleeding, wounds and burns, and helps the formation of granulation and epithelium of ulcerated wounds.

Indication :

Internal and external hemorrhoids, hemorrhoidal bleeding, anal prolapse, anal fistula, periproctitis, lacerated anal wounds, anal pruritus, lacerated perineal wounds.

Administration and Dosage:

Remove wrapper and insert one suppository intrarectally twice daily (morning and evening). In severe cases, also apply before retiring.

Contraindication:

Hypersensitivity to any component of the drug.

Adverse Reactions:

Allergic reaction such as burning sensation of skin, pruritus, rash, urticaria and edema.

Warning and Precaution:

- It should be carefully administered to the following conditions: children, patients with damaged mucosa, history of epilepsy, cardiac dysfunction, bradycardia, liver dysfunction, shock and lactation.
- The use of topical corticosteroid preparation should be avoided during first trimester of pregnancy.
- Avoid long term use (maximum 4 weeks).

Drug Interaction:

Lidocaine can interact with antiarrhythmic drug.

Storage:

Store below 25°C.

Packaging:

Boxes of 2 strips @ 5 suppositories.

Reg. No. DKL7225102553A1.

Other Forms of Presentation:

BORRAGINOL-S Ointment; tubes of net 15 g.

BORRAGINOL-N Ointment; tubes of net 15 g.

BORRAGINOL-N Suppositories; boxes of 2 strips @5 suppositories.

ON MEDICAL PRESCRIPTION ONLY



PT. Takeda Indonesia, Bekasi, Indonesia

Licensed by Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan

SUPPOSITORIA **BORRAGINOL® - S**

LITHOSPERMI RADIX EXTRACTUM

PREDNISOLONUM

LIDOCAINUM

AETHYLIS AMINO BENZOAS

CETRIMIDE

OBAT WASIR

BORRAGINOL-S adalah suatu sediaan untuk penyakit wasir, dalam bentuk suppositoria. Sediaan ini dapat digunakan pada peradangan, gatal-gatal, edema, rasa nyeri dan gejala-gejala alergi serta pengobatan wasir.

Komposisi:

Tiap suppositoria mengandung:

Lithospermi Radix Extractum	0,18 mg
Prednisolonum	1 mg
Lidocainum	15 mg
Aethylis Aminobenzoas	20 mg
Cetrimide	2,5 mg

Cara Kerja:

Zat aktif yang terkandung dalam BORRAGINOL-S mempunyai khasiat anti-peradangan, analgetika, antiseptika, menghilangkan rasa gatal, menghentikan perdarahan pada penderita wasir, luka-luka dan luka bakar, serta membantu pembentukan jaringan granulasi dan epitel dari luka-luka bernanah.

Indikasi:

Wasir bagian luar dan dalam, wasir yang disertai perdarahan, anal prolapse, anal fistula, periproctitis, luka terbuka pada dubur, dan perineal serta rasa gatal pada dubur.

Cara Pemakaian dan Dosis:

Bukalah pembungkusnya dan masukkan 1 suppositoria ke dalam dubur, sehari 2 kali (pagi dan sore hari) Pada kasus yang lebih parah, sekali lagi sebelum tidur

Kontraindikasi:

Hipersensitif terhadap komponen obat.

Efek Samping:

Reaksi alergi pada kulit seperti terasa terbakar, pruritus, kemerahan, urtikaria dan edema.

Peringatan Perhatian:

- Hati-hati penggunaan pada anak-anak, juga pada pasien dengan "*traumated mucosa*", pasien dengan riwayat epilepsi, gangguan fungsi jantung, bradikardi, gangguan fungsi hati, dalam keadaan shock berat dan wanita menyusui.
- Sediaan topikal yang mengandung kortikosteroid sebaiknya tidak digunakan selama trimester I kehamilan.

- Penggunaan jangka panjang harus dihindari (maksimal 4 minggu).

Interaksi Obat:

Lidocain dapat berinteraksi dengan obat-obat antiaritmia.

Cara Penyimpanan:

Simpan pada suhu di bawah 25°C.

Kemasan:

Dus berisi 2 strip @ 5 suppositoria.

No. Reg. DKL7225102553A1.

Bentuk – bentuk lain:

Salep BORRAGINOL-S; dalam tube netto 15g.

Salep BORRAGINOL-N; dalam tube netto 15g.

Suppositoria BORRAGINOL-N; dus berisi 2 strip@ 5 suppositoria.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PT. Takeda Indonesia, Bekasi, Indonesia

Dengan lisensi dari Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Jepang