

# **Bisolvon® Kids**

## **Bromhexine hydrochloride**

### **Composition**

5 ml syrup contain

4 mg N-cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amine hydrochloride  
(= bromhexine hydrochloride)

### **Excipients**

Maltitol Liquid, Sucralose, Benzoic acid, Hydroxyethylcellulose, Strawberry Flavour, Cherry Flavour, Purified Water

### **Product Description**

Clear to almost clear and colourless to almost colourless solution.

### **Indications**

BISOLVON® acts as mucolytic to facilitate productive cough

### **Dosage and Administration**

#### Syrup 4mg/5ml

Adults and children > 10 years : 3 x 10 ml daily

Children 6 - 10 years : 3 x 5ml daily

Children 2 - 5 years : 2 x 5ml daily

Or according to doctor's prescription

### **General**

The syrup is sugar-free and therefore suitable for diabetics and small children.

Patients being treated with BISOLVON® should be notified of an expected increase in the flow of secretions.

In acute respiratory indications, medical advice should be sought if symptoms do not improve or worsen during course of therapy.

### **Contraindications**

BISOLVON® is contraindicated in patients known to be hypersensitive to bromhexine or other excipients of the formulations.

### **Special Warnings and Precautions**

There have been very few reports of severe skin reactions such as erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) and acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) associated with the administration of expectorants such as bromhexine hydrochloride. Mostly these could be explained by the severity of the patient's underlying disease or concomitant medication. In addition during the early phase of a Stevens-Johnson syndrome or TEN a patient may first experience non-specific influenza-like prodromes like e.g. fever, aching body, rhinitis, cough and sore throat. Misled by these non-specific influenza-like prodromes it is possible that a symptomatic treatment is started with a cough and cold medication.

Therefore, if new skin or mucosal lesions occur, medical advice should be sought immediately and treatment with bromhexine hydrochloride discontinued as a precaution.

BISOLVON<sup>®</sup> syrup 4mg/5ml contains 15 g maltitol liquid per maximum recommended daily dose. This product may have a mild laxative effect.

### **Interactions**

No clinically relevant unfavourable interactions with other medications have been reported.

### **Fertility, pregnancy and lactation**

#### Pregnancy

There are limited data from the use of bromhexine in pregnant women.

Pre-clinical studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to reproductive toxicity (see section Toxicology).

As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of BISOLVON<sup>®</sup> during pregnancy.

#### Lactation

It is unknown whether bromhexine/metabolites are excreted in human milk.

Available pharmacodynamic/toxicological data in pre-clinical studies have shown excretion of bromhexine in breast milk.

A risk to the breastfed infant cannot be excluded.

BISOLVON<sup>®</sup> should not be used during breast-feeding.

#### Fertility

No studies on the effect on human fertility have been conducted with BISOLVON<sup>®</sup>.

Based on available pre-clinical experience there are no indications for possible effects of the use of bromhexine on fertility (see section Toxicology).

### **Effects on ability to drive and use machines**

No studies on the effect on the ability to drive and use machines have been performed with BISOLVON<sup>®</sup>.

### **Side Effects**

The following CIOMS frequency rating is used, when applicable:

Very common  $\geq 10\%$ ; Common  $\geq 1$  and  $< 10\%$ ; Uncommon  $\geq 0.1$  and  $< 1\%$ ;

Rare  $\geq 0.01$  and  $< 0.1\%$ ; Very rare  $< 0.01\%$ ; Not known (cannot be estimated from available data).

#### Immune system disorders

Rare: hypersensitivity

Not known: anaphylactic reactions including anaphylactic shock

#### Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Not known: Bronchospasm

#### Gastro-intestinal disorders

Uncommon: Nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal pain upper.

#### Skin and subcutaneous tissue disorders

Rare: rash

Not known: Severe cutaneous adverse reactions (including erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis and acute generalized exanthematous pustulosis), angioedema, urticaria, pruritus.

### **Reporting of suspected adverse reactions**

Report immediately if you experience any adverse reaction or undesirable condition during and after

using the medicinal product to [farmakovigilans@kalventis.com](mailto:farmakovigilans@kalventis.com).

## **Overdose**

### Signs and Symptoms

No specific overdose symptoms have been reported in human.

### Management

Based on accidental overdose and/or medication error reports the observed symptoms are consistent with the known side effects of BISOLVON® at recommended doses and may need symptomatic treatment.

## **Pharmacological Properties**

Pharmacotherapeutic group: Expectorants, excl. combinations with cough suppressants

ATC-Code: R05CB02

Bromhexine is a synthetic derivative of the herbal active ingredient vasicine.

Preclinically, it has been shown to increase the proportion of serous bronchial secretion. Bromhexine enhances mucus transport by reducing mucus viscosity and by activating the ciliated epithelium (mucociliary clearance).

## **Pharmacodynamics**

### Drug/ drug interactions in Pharmacodynamics and Pharmacokinetics

Following the administration of bromhexine antibiotic concentrations (amoxicillin, erythromycin, oxytetracycline) in the sputum and bronchopulmonary secretions are increased.

Also, interaction studies with oral anticoagulants or digoxin were not performed.

Bromhexine pharmacokinetics are not relevantly affected by co-administration of ampicillin or oxytetracycline. There was also no relevant interaction between bromhexine and erythromycin according to a historical comparison. The lack of any relevant interaction reports during the long term marketing of the drug suggests no substantial interaction potential with these drugs.

## **Pharmacokinetics**

### Absorption

Bromhexine is rapidly and completely absorbed from the gastrointestinal tract.

After oral administration solid and liquid formulations show similar bioavailability.

The absolute bioavailability of bromhexine hydrochloride was about  $22.2 \pm 8.5$  % and  $26.8 \pm 13.1$  % for BISOLVON® tablets and solution, respectively.

The first pass metabolism amounts to about 75-80%.

Concomitant food leads to an increase of bromhexine plasma concentrations.

### Distribution

After intravenous administrations bromhexine was rapidly and widely distributed throughout the body with a mean volume of distribution ( $V_{ss}$ ) of up to  $1209 \pm 206$  L (19 L/kg). The distribution into lung tissue (bronchial and parenchymal) was investigated after oral administration of 32 mg and 64 mg bromhexine. Lung-tissue concentrations two hours post dose were 1.5 - 3.2 times higher in bronchiolo-bronchial tissues and between 2.4 and 5.9 times higher in pulmonary parenchyma compared to plasma concentrations

Unchanged bromhexine is bound to plasma proteins by 95 % (non-restrictive binding).

### Metabolism

Bromhexine is almost completely metabolised to a variety of hydroxylated metabolites and to dibromanthranilic acid. All metabolites and bromhexine itself are conjugated most probably in form of N-glucuronides and O-glucuronides. There are no substantial hints for a change of the metabolic

pattern by a sulphonamide, oxytetracycline or erythromycin. Thus relevant interactions with CYP 450 2C9 or 3A4 substrates are unlikely.

#### Elimination

Bromhexine is a high extraction ratio drug (CL after intravenous (i.v.) administration in the range of the hepatic blood flow, 843-1073 mL/min) resulting in high inter- and intra-individual variability (CV > 30 %). After administration of radiolabelled bromhexine about 97.4 ± 1.9 % of the dose were recovered as radioactivity in urine, with less than 1% as parent compound. Bromhexine plasma concentrations showed a multiexponential decline. After administration of single oral doses between 8 and 32 mg, the terminal elimination half-life ranged between 6.6 and 31.4 hours. The relevant half-life to predict the multiple dose pharmacokinetics is about 1 hour, thus no accumulation was seen after multiple dosing (accumulation factor 1.1).

#### **Linearity/Non-Linearity**

Bromhexine shows dose proportional pharmacokinetics in the range of 8-32 mg following oral administration.

#### **Special populations**

There are no data for bromhexine pharmacokinetics in the elderly or in patients with renal or liver insufficiency. Extensive clinical experience did not give rise to relevant safety concerns in these populations.

#### **Clinical Studies**

In clinical studies, bromhexine showed a secretolytic and secretomotor effect in the bronchial tract area, which facilitates expectoration and eases cough.

#### **Nonclinical Safety Data**

##### Single Dose Toxicity

Bromhexine hydrochloride showed low acute toxicity: Oral Lethal Dose (LD<sub>50</sub>) values were > 5 g/kg in rats, > 4 g/kg in rabbits, > 10 g/kg in dogs, and > 1 g/kg in newborn rats. The intra peritoneal . LD<sub>50</sub> in rats was 2 g/kg. The LD<sub>50</sub> values for the syrup formulation were > 10 ml/kg in mice and rats. No specific clinical signs of toxicity were observed at these doses.

A single intraarticular injection of 4 mg bromhexine was well tolerated in rats and dogs. The lesions after intramuscular injection in rabbits compared well with those after physiological saline solution. Bromhexine hydrochloride was hemolytic *in vitro*.

##### Repeat Dose Toxicity

In repeat oral dose toxicity studies over 5 weeks, mice tolerated 200 mg/kg bromhexine hydrochloride representing the "no observed adverse effect level" (NOAEL). At 2000 mg/kg, mortality was high. The few surviving animals showed a reversible increase in liver weight and serum cholesterol. Rats tolerated 25 mg/kg over 26 or 100 weeks, while at 500 mg/kg, convulsions and deaths occurred. The centrilobular hepatocytes were enlarged due to vacuolic change. Another 2 year study confirmed that doses up to 100 mg/kg are well tolerated, while at 400 mg/kg, convulsions occurred sporadically in a few animals. Dogs tolerated 100 mg/kg (NOAEL) orally over 2 years.

BISOLVON<sup>®</sup> Syrup (0.8 mg/ml) was well tolerated up to 20 ml/kg in rats with a reversible centrilobular simple fatty change of liver. After intramuscular administration of 8 mg injectable solution in dogs for 6 weeks there was no local irritation or systemic toxicity.

##### Reproductive and Developmental Toxicity

Bromhexine hydrochloride was neither embryotoxic nor teratogenic (segment II) at oral doses up to 300 mg/kg in rats and 200 mg/kg in rabbits. Fertility (segment I) was not impaired at doses up to 300

mg/kg. The "NOAEL" during peri- and postnatal development (segment III) was 25 mg/kg.

#### Genotoxicity

Bromhexine hydrochloride had no mutagenic potential in the bacterial mutation assay and the mouse bone marrow micronucleus test.

#### Carcinogenicity

Bromhexine hydrochloride did not show a tumorigenic potential in the 2-year studies on rats given up to 400 mg/kg, and on dogs given up to 100 mg/kg.

#### **Availability**

Syrup 4 mg/5 ml      Bottle of 60 ml      Reg. No. DTL1821207237A1

**Store below 30°C, in a well-closed container.  
Store in a safe place, out of the reach of children.**

P No. 1  
Awat! Obat Keras  
Bacalah aturan memakainya

#### **Manufactured by:**

PT. Menarini Indria Laboratories  
Bekasi, Indonesia

#### **For:**

PT. Kalventis Sinergi Farma  
Jakarta, Indonesia

#### **Under license from:**

Opella Healthcare International SAS, France

Revision date: 9 June 2025 (based CCDS V1)

# Opella.



ID00410000475771021

# **Bisolvon® Kids**

## **Bromheksin hidroklorida**

### **Komposisi**

5 ml sirup mengandung  
4 mg N-cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amine hydrochloride  
(= bromheksin hidroklorida)

### **Indikasi**

BISOLVON® bekerja sebagai mukolitik untuk meredakan batuk berdahak

### **Zat Tambahan**

Maltitol Liquid, Sucralose, Benzoic acid, Hydroxyethylcellulose, Strawberry Flavour, Cherry Flavour, Purified Water

### **Deskripsi Produk**

Larutan bening/hampir jernih, dan tidak berwarna/hampir tidak berwarna.

### **Dosis dan Cara Penggunaan**

#### Sirup 4mg/5ml

Dewasa dan Anak >10 tahun : 3 x 10 ml per hari

Anak 6 - 10 tahun : 3 x 5 ml per hari

Anak 2 - 5 tahun : 2 x 5 ml per hari

Atau sesuai dengan petunjuk dokter.

### **Umum**

Sirup yang digunakan bebas gula sehingga cocok untuk penderita diabetes dan anak-anak.

Pasien yang diobati dengan BISOLVON® harus diberitahu mengenai adanya kemungkinan peningkatan jumlah aliran sekresi.

Untuk indikasi pernapasan akut, jika gejala tidak membaik atau memburuk selama proses terapi, hubungi dokter.

### **Kontraindikasi**

BISOLVON® dikontraindikasikan pada penderita yang hipersensitif terhadap bromheksin HCl atau eksipien lain dalam formula.

### **Peringatan dan Perhatian**

Terdapat sangat sedikit laporan mengenai reaksi alergi berat seperti *erythema multiforme*, *Stevens-Johnson syndrome (SJS)* dan *toxic epidermal necrolysis (TEN)* dan *acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)* secara temporal terkait penggunaan ekspektoran seperti bromheksin HCl. Hal tersebut kebanyakan disebabkan oleh penyakit yang diderita pasien sebelumnya dan/atau pemberian yang bersamaan dengan obat lain. Sebagai tambahan fase awal dari sindrom Stevens-Johnson atau TEN, pasien dapat mengalami gejala awal menyerupai influenza non-spesifik misalnya demam, tubuh ngilu, rinitis, batuk dan sakit tenggorokan. Kekeliruan akibat gejala-gejala ini memungkinkan seorang pasien mulai diberikan pengobatan simptomatik seperti obat batuk dan pilek. Oleh karena itu, jika terjadi lesi kulit atau mukosa baru, segera hubungi dokter dan hentikan penggunaan bromheksin hidroklorida sebagai tindakan pencegahan.

BISOLVON® sirup 4mg/5ml mengandung 15 g maltitol cair per dosis maksimum harian yang direkomendasikan. Produk ini dapat memiliki efek laksatif ringan.

## **Interaksi Obat**

Tidak ada laporan interaksi klinis yang tidak menguntungkan dengan obat ini.

## **Kesuburan, Kehamilan dan Laktasi**

### Kehamilan

Penggunaan Bromhexine pada wanita hamil memiliki data yang terbatas.

Uji praklinik tidak menunjukkan efek berbahaya baik langsung maupun tidak langsung terhadap toksisitas reproduksi (lihat bagian toksikologi).

Sebagai tindakan pencegahan, lebih baik menghindari penggunaan BISOLVON® selama kehamilan.

### Laktasi

Tidak diketahui apakah bromheksin / metabolitnya diekskresikan dalam air susu manusia.

Data farmakodinamik / toksikologi yang tersedia pada uji praklinik telah menunjukkan ekskresi bromheksin dalam ASI.

Adanya kemungkinan timbulnya risiko bagi bayi penerima ASI tidak dapat dikesampingkan.

BISOLVON® tidak boleh digunakan selama menyusui.

### Kesuburan

Tidak ada studi tentang efek pada kesuburan manusia telah dilakukan dengan BISOLVON®.

Berdasarkan pengalaman praklinik yang tersedia, tidak ada indikasi untuk kemungkinan efek dari penggunaan bromheksin pada kesuburan (lihat bagian toksikologi).

## **Efek pada kemampuan mengemudi dan menggunakan mesin**

Tidak ada studi tentang efek pada kemampuan mengemudi dan menggunakan mesin yang telah dilakukan dengan BISOLVON®.

## **Efek Samping**

Peringkat frekuensi CIOMS berikut digunakan, jika berlaku:

Sangat umum  $\geq 10\%$ ; Umum  $\geq 1$  dan  $< 10\%$ ; Jarang  $\geq 0,1$  dan  $< 1\%$ ;

Langka  $\geq 0,01$  dan  $< 0,1\%$ ; Sangat jarang  $< 0,01\%$ ; Tidak diketahui (tidak dapat diperkirakan dari data yang tersedia).

### Gangguan sistem kekebalan tubuh

Jarang: hipersensitivitas

Tidak diketahui: reaksi anafilaksis termasuk syok anafilaktik

### Gangguan pernapasan, toraks dan mediastinum

Tidak diketahui: bronkospasme

### Gangguan sistem pencernaan

Jarang: mual, muntah, diare dan nyeri perut bagian atas.

### Kulit dan gangguan jaringan subkutan

Jarang: Tidak diketahui: efek samping kulit berat (termasuk *erythema multiforme*, *Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis* dan *acute generalized exanthematous pustulosis*), angioedema, urtikaria, pruritus.

## **Pelaporan efek samping**

Segera laporkan apabila Anda mengalami keluhan efek samping atau kondisi tidak nyaman selama dan setelah penggunaan obat kepada [farmakovigilans@kalventis.com](mailto:farmakovigilans@kalventis.com). Anda dapat membantu memberikan informasi terkait keamanan obat ini.

## **Kelebihan Dosis**

### Tanda dan Gejala

Tidak ada gejala kelebihan dosis spesifik yang dilaporkan pada manusia.

### Manajemen

Berdasarkan laporan overdosis dan/atau kesalahan pengobatan yang tidak disengaja, gejala yang diamati konsisten dengan efek samping yang diketahui pada dosis yang direkomendasikan dan mungkin membutuhkan pengobatan simptomatik.

## **Farmakologi**

Kelas Farmakoterapi: ekspektoran, kecuali kombinasi dengan penekan batuk

ATC-Code: R05CB02

Bromheksin adalah turunan sintesis dari bahan aktif herbal vasicine. Secara praklinik telah terbukti meningkatkan proporsi sekresi bronkial serosa. Bromheksin meningkatkan transpor mukus dengan mengurangi viskositas mukus dan dengan mengaktifkan epitel bersilia (klirens mukosilia).

## **Farmakodinamik**

### Interaksi antar obat pada Farmakodinamik dan Farmakokinetik

Setelah pemberian bromheksin, konsentrasi antibiotik (amoksisilin, eritromisin, oksitetrasiklin) dalam dahak dan sekresi bronkopulmonari meningkat.

Studi interaksi dengan anti koagulan atau digoksin tidak dilakukan.

Farmakokinetik bromheksin secara relevan tidak dipengaruhi oleh penggunaan yang bersamaan dengan ampicilin atau oksitetrasiklin. Tidak terdapat interaksi yang relevan antara bromheksin dan eritromisin menurut perbandingan historis. Tidak ada laporan interaksi yang relevan selama pemasaran obat jangka panjang yang menunjukkan tidak adanya potensi interaksi substansial dengan obat-obat ini.

## **Farmakokinetika**

### Absorpsi

Bromheksin secara cepat diserap di saluran cerna.

Bioavailabilitas yang sama ditunjukkan setelah penggunaan oral formulasi padat dan cair.

Bioavailabilitas absolut dari bromheksin hidroklorida sekitar  $22.2 \pm 8.5\%$  dan  $26.8 \pm 13.1\%$  terhadap masing-masing BISOLVON<sup>®</sup> tablet dan larutan.

Metabolisme jalur pertama berjumlah sekitar 75-80%.

Penggunaan bersamaan dengan makanan akan menyebabkan peningkatan konsentrasi plasma bromheksin.

### Distribusi

Setelah pemberian secara intravena, bromheksin akan didistribusikan secara cepat dan luas keseluruh tubuh dengan volume distribusi rata-rata ( $V_{ss}$ ) hingga  $1209 \pm 206$  L ( $19$  L/kg). Distribusi obat ke jaringan paru (bronkus dan parenkim) teramati setelah pemberian bromheksin 32 mg and 64 mg. Konsentrasi pada jaringan paru dua jam pasca dosis adalah 1.5 - 3.2 kali lebih tinggi pada jaringan bronkiolo-bronkial dan antara 2.4 dan 5.9 kali lebih tinggi pada parenkim paru dibandingkan dengan konsentrasi plasma.

Bromheksin dalam bentuk utuh yang terikat dengan protein plasma sebesar 95 % (non-pengikatan terbatas).

### Metabolisme

Hampir seluruh bromheksin di metabolisme menjadi berbagai metabolit yang terhidroksilasi dan asam dibromanthranilic. Semua metabolit dan bromheksin itu sendiri sebagian besar akan

terkonjugasi dalam bentuk N-glukuronida dan O-glukuronida. Tidak ada petunjuk secara substansial untuk perubahan pola metabolisme oleh sulfonamid, oksitetrasiklin, dan eritromisin. sehingga tidak mungkin ada interaksi yang relevan dengan substrat CYP 450 2C9 atau 3A4.

### Eliminasi

Bromheksin merupakan obat dengan rasio ekstraksi tinggi (CL setelah pemberian secara intravena (i.v.) dalam kisaran aliran darah hepatic, 843-1073 mL/menit) yang akan menghasilkan variabilitas antar-dan intra-individual tinggi (CV >30 %). Setelah pemberian bromheksin radiolabel, ditemukan sekitar  $97.4 \pm 1.9\%$  dari dosis bersifat radioaktif dalam urin, dengan kadar kurang dari 1% sebagai senyawa induk. Konsentrasi plasma bromheksin menunjukkan penurunan secara multieksponensial. Setelah pemberian oral dosis tunggal antara 8 dan 32 mg, waktu paruh eliminasi terminal berkisar antara 6,6 and 31,4 jam. Waktu paruh relevan untuk memprediksi farmakokinetik dosis ganda sekitar 1 jam, sehingga tidak ada akumulasi yang terlihat setelah beberapa dosis. (faktor akumulasi 1.1)

### **Linearitas/Non-linearitas**

Setelah pemberian oral bromheksin menunjukkan farmakokinetik yang proposional dengan dosis antara 8-32 mg.

### **Populasi khusus**

Tidak ada data farmakokinetik bromheksin pada usia lanjut atau pasien dengan insufisiensi ginjal atau hati. Berdasarkan pengalaman klinis secara luas, bromheksin tidak menyebabkan masalah keamanan yang relevan pada populasi ini.

### **Studi Klinis**

Studi klinis menunjukkan bahwa bromheksin memiliki efek sekretolitik dan sekretomotor pada daerah saluran bronkus, yang dapat mempermudah pengeluaran dahak dan batuk.

### **Data Keamanan Non Klinis**

#### Toksistas Dosis Tunggal

Bromheksin hidroklorida menunjukkan toksistas akut rendah : nilai LD<sub>50</sub> adalah > 5 g/kg pada tikus, > 4 g/kg pada kelinci, > 10 g/kg pada anjing, dan > 1 g/kg pada tikus yang baru lahir. LD<sub>50</sub> i.p pada tikus adalah 2 g/kg. Nilai LD<sub>50</sub> untuk formulasi sirup adalah > 10 ml/kg pada mencit dan tikus. Tidak ada tanda klinis yang spesifik dari toksistas yang diamati pada dosis tersebut.

Injeksi tunggal 4 mg bromheksin secara intraartikular (i.a.) dapat diterima dengan baik oleh tikus dan anjing. Lesi pada kelinci setelah pemberian injeksi intramuscular (i.m.) sebanding dengan lesi setelah pemberian larutan garam fisiologis. Bromheksin hidroklorida merupakan hemolitik in vitro.

#### Toksistas Dosis Berulang

Pada studi toksistas dosis oral berulang selama 5 minggu, 200 mg/kg bromheksin hidroklorida ditoleransi oleh mencit mewakili "NOAEL". Pada 2000 mg/kg, angka kematian tinggi. Beberapa hewan yang bertahan hidup memperlihatkan reversibilitas peningkatan berat hati dan kolesterol serum. Dosis 25 mg/kg selama lebih dari 26 atau 100 minggu dapat ditoleransi oleh tikus, sedangkan pada dosis 500 mg/kg, terjadi kejang dan kematian. Hepatosit centribular mengalami perbesarankarena perubahan vakuola. Studi lainnya selama 2 tahun mengkonfirmasi bahwa dosis hingga 100 mg/kg dapat ditoleransi dengan baik, sedangkan pada dosis 400 mg/kg, kejang terjadi secara sporadis pada beberapa hewan. Dosis 100 mg/kg (NOAEL) secara oral selama 2 tahun dapat ditoleransi oleh anjing.

BISOLVON<sup>®</sup> Sirup (0.8 mg/ml) ditoleransi secara baik hingga 20 ml/kg pada tikus dengan centrilobular pengubah lemak hati sederhana yang reversibel. Setelah pemberian 8 mg larutan injeksi secara intramuskular pada anjing selama 6 minggu tidak ada iritasi lokal atau toksistas sistemik.

### Toksisitas Reproduksi dan Perkembangan

Bromheksin hidroklorida pada dosis oral hingga 300 mg/kg pada tikus dan 200 mg/kg pada kelinci tidak embriotoksik ataupun teratogenik (segmen II). Fertilitas (segment I) tidak terganggu dengan dosis hingga 300 mg/kg. "NOAEL" selama perkembangan peri-dan postnatal (segmen III) adalah 25 mg/kg.

### Genotoksisitas

Bromheksin hidroklorida tidak memiliki potensi mutagenik pada studi mutasi terhadap bakteri dan uji pada mikronukleous tulang sumsum tikus.

### Karsinogenisitas

Bromheksin hidroklorida tidak menunjukkan potensi tumorigenik pada studi selama 2 tahun yang diberikan pada tikus hingga 400 mg/kg, dan pada anjing hingga 100 mg/kg.

### **Kemasan**

Sirup 4 mg/5 ml      Botol 60 ml      Reg. No. DTL1821207237A1

**Simpan dibawah suhu 30°C, pada tempat tertutup rapat.  
Simpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak.**

P No. 1  
Awat! Obat Keras  
Bacalah aturan memakainya

### **Diproduksi oleh:**

PT. Menarini Indria Laboratories  
Bekasi, Indonesia

### **Untuk:**

PT. Kalventis Sinergi Farma  
Jakarta, Indonesia

### **Di bawah lisensi dari:**

Opella Healthcare International SAS, France



ID00410000475771021

Revision date : 9 June 2025 (based on CCDS V1)

# Opella.