

# FINAL ARTWORK



PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

Technical Operations  
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 38, Cilangkap, Tapos, Depok, 16458  
Phone : (62 21) 875 25 83

- a. Nama Bahan Kemasan : LEAFLET COUNTERPAIN PXM  
(Packaging Material Name)  
b. Kode Bahan Kemasan : D096G (TPI/D096G/A-0922)  
(Packaging Material Code No)  
c. Negara : Indonesia  
(Country)  
d. Tanggal Pembuatan : 13 SEP 2022/ Rev. 00  
(Date of Preparation)  
e. Ukuran (P X L) : 90 x 210 mm  
(Dimension : W X H)  
f. Tipe Material & Coating : HVS 60 gsm / Coating : -  
(Type of Material & Coating)  
g. Ukuran Huruf (minimal) : Helvetica Regular: 5.0 pt  
(Min. Point size) Helvetica Bold: 3.48 pt  
Roboto Bold: 1.77 pt

- h. Kode Warna :  
(Color code)

Warna Utama (Main Color)	■ Black
Warna turunan (Derivation color)	-
Warna Gradasi (Gradient color)	-
Gambar (Images)	-

(Note : CMYK color based on Color chart)

- i. Dibuat oleh : Packaging Development  
(Prepared by)

Logo halal:



## Information for Brand Name and Generic Name

Scale 100%  
**Counterpain<sup>®</sup> PXM** → 3.888 mm  
**piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol** → 3.261 mm  
% Generic Name/Brand Name  
= (3.261 mm / 3.888 mm) x 100%  
= 83.87 %

## Detail Fonts

\* For Special Fonts, dimension refer to WxH based on transform in Ai software preview.

Texts	Font Type	Font Size
PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.	Special Font	58.443 x 1.909 mm
<b>Counterpain<sup>®</sup> PXM</b>	Special Font	38.982 x 5.488 mm
<b>piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol</b>	Special Font	52.049 x 8.792 mm
All texts	Helvetica Bold/ Helvetica Regular	5.5 pt
P No. 3 Awasi Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	Helvetica Bold	3.48 pt
Codification texts (Film #, supplier code week & year of printing, code no of repro)	Helvetica Regular	5.0 pt
<b>ID00410000132970521</b>	Roboto Bold	1.77 pt
Folded Type: Horizontal: 3 X	Pharmaco & Visual code: 23	Software: Adobe Illustrator 2022

TPI/D096G/A-0922

PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

## Counterpain<sup>®</sup> PXM

### piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol

**KOMPOSISI**  
Setiap gram Counterpain<sup>®</sup> PXM mengandung zat-zat aktif: piroxicam 5 mg, methyl salicylate 102 mg, l-menthol 54,3 mg, eugenol 13,7 mg dalam gel dasar Counterpain<sup>®</sup>.

**DESKRIPSI**  
Piroxicam merupakan zat anti-inflamasi non-steroid N-heterosiklik carboxamida 1,2-benzothiazin-1,1-dioksida.

**CARA KERJA OBAT**  
Counterpain<sup>®</sup> PXM mempunyai khasiat anti inflamasi non-steroid dengan sifat analgesik.  
Counterpain<sup>®</sup> PXM bekerja dengan cara menghambat biosintesa prostaglandin melalui penghambatan yang reversibel terhadap enzim siklooksigenase.

**INDIKASI**  
Berbagai keadaan yang disertai dengan rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoarthritis (arthrosis, penyakit sendi degeneratif), gangguan muskuloskeletal post-traumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosynovitis, periarthritis, keseleo, tegang otot dan sakit punggung ruas bawah. Counterpain<sup>®</sup> PXM juga memberikan rasa hangat yang meresap dengan segera. (Karena formula dasar Counterpain<sup>®</sup>).

**KONTRAINDIKASI**  
Pasien yang hipersensitif terhadap piroxicam. Sensitivitas silang terhadap asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid lainnya. Pasien yang menderita asma, rinitis, angiodema atau urtikaria akibat asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid.

**PERINGATAN**  
Untuk mencegah toksisitas aditif, hindari pemakaian piroxicam dalam bentuk dosis lain secara bersamaan.  
Penggunaan saat kehamilan dan menyusui:  
Keamanan penggunaan Counterpain<sup>®</sup> PXM pada saat kehamilan atau menyusui belum diketahui. Counterpain<sup>®</sup> PXM menghalangi sintesis prostaglandin dan dilepaskan melalui hambatan bolak-balik enzim siklooksigenase. Efek ini, seperti agen anti-inflamasi lainnya, diasosiasikan dengan peningkatan terjadinya distosia dan penundaan parturisi pada kehamilan hewan bila penggunaan obat ini diteruskan saat kehamilan tingkat lanjut. Obat anti-inflamasi non-steroid juga dapat menginduksi penutupan duktus arteriosus pada bayi. Studi awal mengindikasikan ditemukannya piroxicam pada air susu ibu pada konsentrasi 1% setelah pemakaian oral. Counterpain<sup>®</sup> PXM tidak dianjurkan untuk ibu menyusui.

**PERHATIAN**  
Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi lokal. Hindari kontak dengan mata, membran mukus atau pada kulit yang terluka.

**DOSIS & PENGGUNAAN**  
Counterpain<sup>®</sup> PXM hanya untuk pemakaian luar. Jangan digunakan dalam pembalut oklusif. Oles gel secara merata pada kulit. Satu gram gel (setara dengan 5 mg piroxicam) dioleskan pada tempat yang sakit 3 hingga 4 kali sehari.

**EFEK SAMPING**  
Jarang dilaporkan efek samping akibat pemakaian Counterpain<sup>®</sup> PXM. Sebagian besar efek samping menyangkut iritasi lokal ringan atau sedang, eritema, ruam, deskuamasi pitiroid, pruritus dan reaksi setempat pada tempat nyeri. Perubahan warna kulit sementara dan noda pada pakaian ditemukan bila gel tidak dioleskan secara merata.

**PENYIMPANAN**  
Simpan dibawah suhu 30°C, lindungi dari cahaya.  
No. Reg.: DTL1124403528A1

P No. 3  
Awasi Obat Keras  
Hanya untuk bagian luar badan

Dibuat oleh:  
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.  
Depok - Indonesia.  
Under authority of  
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.  
Tokyo, Japan.

Supplier code week and year of printing  
Code no of repro

TPI/D096G/A-0922

PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

## Counterpain<sup>®</sup> PXM

### piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol

**KOMPOSISI**  
Setiap gram Counterpain<sup>®</sup> PXM mengandung zat-zat aktif: piroxicam 5 mg, methyl salicylate 102 mg, l-menthol 54,3 mg, eugenol 13,7 mg dalam gel dasar Counterpain<sup>®</sup>.

**DESKRIPSI**  
Piroxicam merupakan zat anti-inflamasi non-steroid N-heterosiklik carboxamida 1,2-benzothiazin-1,1-dioksida.

**CARA KERJA OBAT**  
Counterpain<sup>®</sup> PXM mempunyai khasiat anti inflamasi non-steroid dengan sifat analgesik.  
Counterpain<sup>®</sup> PXM bekerja dengan cara menghambat biosintesa prostaglandin melalui penghambatan yang reversibel terhadap enzim siklooksigenase.

**INDIKASI**  
Berbagai keadaan yang disertai dengan rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoarthritis (arthrosis, penyakit sendi degeneratif), gangguan muskuloskeletal post-traumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosynovitis, periarthritis, keseleo, tegang otot dan sakit punggung ruas bawah. Counterpain<sup>®</sup> PXM juga memberikan rasa hangat yang meresap dengan segera. (Karena formula dasar Counterpain<sup>®</sup>).

**KONTRAINDIKASI**  
Pasien yang hipersensitif terhadap piroxicam. Sensitivitas silang terhadap asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid lainnya. Pasien yang menderita asma, rinitis, angiodema atau urtikaria akibat asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid.

**PERINGATAN**  
Untuk mencegah toksisitas aditif, hindari pemakaian piroxicam dalam bentuk dosis lain secara bersamaan.  
Penggunaan saat kehamilan dan menyusui:  
Keamanan penggunaan Counterpain<sup>®</sup> PXM pada saat kehamilan atau menyusui belum diketahui. Counterpain<sup>®</sup> PXM menghalangi sintesis prostaglandin dan dilepaskan melalui hambatan bolak-balik enzim siklooksigenase. Efek ini, seperti agen anti-inflamasi lainnya, diasosiasikan dengan peningkatan terjadinya distosia dan penundaan parturisi pada kehamilan hewan bila penggunaan obat ini diteruskan saat kehamilan tingkat lanjut. Obat anti-inflamasi non-steroid juga dapat menginduksi penutupan duktus arteriosus pada bayi. Studi awal mengindikasikan ditemukannya piroxicam pada air susu ibu pada konsentrasi 1% setelah pemakaian oral. Counterpain<sup>®</sup> PXM tidak dianjurkan untuk ibu menyusui.

**PERHATIAN**  
Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi lokal. Hindari kontak dengan mata, membran mukus atau pada kulit yang terluka.

**DOSIS & PENGGUNAAN**  
Counterpain<sup>®</sup> PXM hanya untuk pemakaian luar. Jangan digunakan dalam pembalut oklusif. Oles gel secara merata pada kulit. Satu gram gel (setara dengan 5 mg piroxicam) dioleskan pada tempat yang sakit 3 hingga 4 kali sehari.

**EFEK SAMPING**  
Jarang dilaporkan efek samping akibat pemakaian Counterpain<sup>®</sup> PXM. Sebagian besar efek samping menyangkut iritasi lokal ringan atau sedang, eritema, ruam, deskuamasi pitiroid, pruritus dan reaksi setempat pada tempat nyeri. Perubahan warna kulit sementara dan noda pada pakaian ditemukan bila gel tidak dioleskan secara merata.

**PENYIMPANAN**  
Simpan dibawah suhu 30°C, lindungi dari cahaya.  
No. Reg.: DTL1124403528A1

P No. 3  
Awasi Obat Keras  
Hanya untuk bagian luar badan

Dibuat oleh:  
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.  
Depok - Indonesia.  
Under authority of  
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.  
Tokyo, Japan.

Supplier code week and year of printing  
Code no of repro

**Keterangan :**  
"Supplier code, week & year of printing" akan berubah setiap naik cetak (sesuai PO)  
Contoh :  
Estimasi cetak tanggal : 09 - 15 Jan 2022, maka:  
Minggu ke : 02 (dihitung dari awal tahun 2022)  
Tahun cetak : 22  
Misal Kode supplier : SP  
Jadi penulisan kodifikasi di proof print adalah :  
**SP0222**  
~ Ukuran dan Tipe huruf, silahkan lihat di tabel  
~ Lokasi & warna teks disesuaikan dengan approved artwork ex TPI

**Note:**  
"Supplier code, week & year of printing" will be change every printed (based on PO)  
So it's mean:  
Year : 22  
for example, Supplier code : SP  
So the codification written in proof print is  
**SP0222**  
~ Font type & font size, following the table  
~ Location & color of texts, following approved artwork ex TPI

View 120%

View 100%

Approved by:						
Technical Services	Regulatory	Medical Affairs	Marketing	Value Stream	Quality Control	Quality Assurance

NOTIFIKASI: 21/01/2026

ID: EREG100020VR12600004