

Frutiger 65Bold_18.0pt
Frutiger 65Bold_14.4pt (80%)

CEDOCARD® 5 Isosorbide dinitrate 5 mg VASODILATOR KORONER Tablet KOMPOSISI Tiap tablet mengandung : 1,4 : 3,6-dianhidrosorbitol 2,5-dinitrate (Isosorbide Dinitrate)... 5 mg URAIAN CEDOCARD® 5, melebarkan pembuluh-pembuluh darah jantung dan bila diberikan secara sublingual, kemanjurannya sebanding dengan nitroglycerin, tetapi CEDOCARD® 5 memberikan efek yang lebih lama dengan mulainya daya kerja yang hampir sama. Pemberian nitroglycerin (0,1 - 0,6 mg) secara sublingual akan memberikan daya kerjanya setelah 1-3 menit, tetapi hanya berlangsung selama 20-30 menit. Sedangkan CEDOCARD® 5 yang diberikan secara sublingual, daya kerjanya akan terlihat dalam waktu kira-kira 2 menit dan berlangsung selama 2 sampai 3 jam. Pemberian CEDOCARD® 5 secara oral, daya kerja dimulai dalam waktu 20 sampai 30 menit kemudian dan akan dipertahankan untuk sekurang-kurangnya 4 jam. Cepatnya daya kerja CEDOCARD® 5 yang sebanding dengan nitroglycerin disebabkan oleh karena kelarutannya yang tinggi dalam air, dan daya kerja yang diperpanjang dari CEDOCARD® 5 disebabkan oleh lebih lambatnya proses peruraian oleh enzim-enzim dibandingkan dengan nitroglycerin. INDIKASI Untuk pengobatan angina pectoris dan untuk pencegahan terjadinya serangan angina pada penderita penyakit jantung koroner menahun. Untuk pengobatan gangguan angina sesudah infark miokardial. POSOLOGI Untuk serangan angina pectoris, 1 tablet dilarutkan perlahan-lahan dalam mulut dibawah lidah. Untuk pengobatan pencegahan, tergantung dari beratnya penyakit, 1 sampai 2 tablet 3 atau 4 kali sehari. Untuk mencegah serangan pada malam hari, 1 sampai 2 tablet sebelum tidur. PERINGATAN DAN PERHATIAN Pada umumnya CEDOCARD® 5 tidak memberikan efek samping yang berarti, tetapi pada beberapa penderita mungkin akan menimbulkan sakit kepala yang biasanya terjadi apabila menerima dosis harian sampai 40 mg atau lebih. Tetapi sakit kepala akan berhenti, bila dosis dikurangi hingga 1/2 tablet 3 x sehari, dan tidak akan menimbulkan kembali gangguan sakit kepala, walaupun dosis dinaikkan lagi setelah beberapa hari. Pada pengobatan jangka panjang dengan CEDOCARD® 5 kepekaan terhadap sakit kepala akan hilang tanpa keharusan penyesuaian dosis dan kerja memperlebar pembuluh-pembuluh darah jantung tidak akan berkurang. EFEK SAMPING Nyeri kepala yang bersifat sementara. KONTRAINDIKASI Hipotensi, syok kardiogenik. Hipersensitif terhadap isosorbide dinitrate HARUS DENGAN RESEP DOKTER Simpan pada suhu dibawah 30°C KEMASAN Box berisi 60 tablet dalam 6 strip @ 10 tablet. Reg. No. : DKL7204520210A1 Diproduksi oleh: PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Citeureup, Bogor, Indonesia  Dipasarkan oleh:  Atas lisensi dari :  Takeda Nederland bv Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp, The Netherlands	CEDOCARD® 5 Isosorbide dinitrate 5 mg CORONARY VASODILATOR Tablet COMPOSITION Each tablet contains : 1,4 : 3,6-dianhidrosorbitol 2,5-dinitrate (Isosorbide Dinitrate) 5 mg DESCRIPTION CEDOCARD® 5, dilates the coronary vessels and, when given sublingually, its efficacy is to be compared with nitroglycerin, but CEDOCARD® 5 provides a longer duration of effect where as the onset of action is almost the same. After sublingual administration of nitroglycerin (0.1 - 0.6 mg) the onset of action takes place within 1 to 3 minutes, but it lasts only for 20 to 30 minutes. After sublingual administration of CEDOCARD® 5 the onset of action takes place within 2 minutes and lasts for 2 to 3 hours. After oral administration of CEDOCARD® 5 the onset of action commences within 20 to 30 minutes and is maintained for at least 4 hours. The rapid onset of action of CEDOCARD® 5 compared with nitroglycerin, can be explained by its high water solubility. Furthermore, the sustained action of CEDOCARD® 5 is due to the comparably much lower rate of decomposition by enzymes. INDICATIONS For treatment of angina pectoris and for prophylaxis of angina attacks in patients suffering from chronic coronary diseases; For treatment of angina disorders after myocardial infarction. DOSAGE AND ADMINISTRATION In attacks of angina pectoris 1 tablet to be slowly dissolved in the mouth (sublingually). For prophylactic treatment depending on severity of disease, 1 to 2 tablets 3 or 4 times daily. To prevent nocturnal attacks 1 to 2 tablets before retirement. PRECAUTIONS In general, CEDOCARD® 5 does not entail serious side effects but in some patients it might give rise to headaches which mostly occur when the daily dose is 40 mg or more. The headaches cease, however, when the dose is reduced to half a tablet 3 times a day, and it is not likely to reoccur when the daily dose is increased again after a few days. In long-term CEDOCARD® 5 therapy the susceptibility to headache subsides without modification of dosage and the coronary dilatory action is maintained. SIDE EFFECTS Transient headache. CONTRAINDICATIONS Hypotension, cardiac shock. Hypersensitivity to isosorbide dinitrate ON DOCTOR'S PRESCRIPTION ONLY Store at temperature below 30°C PRESENTATION Box of 60 tablets in 6 strips of 10 tablets. Reg. No. : DKL7204520210A1 Manufactured by: PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Citeureup, Bogor, Indonesia  Marketed by:  Under license from:  Takeda Nederland bv Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp, The Netherlands
--	--

PIN-0000297

 Darya-Varia LABORATORIA Date : 22-FEB-2021 Note : re_design		Finishing : LIPAT 3X HORIZONTAL	Remarks > Artwork mengacu pada CC DVL-19-381 Penambahan produk halal baru untuk kategori obat fase 2B	Approved by :	
Product : IN CEDOCARD TAB 5MG Material : HVS 60 g Dimensi : 70 X 202 MM Color :  Pantone Black C	Arah Roll :	QC		QA	
Drawing by : SNS / PMQC DVL Citeureup Plant				HRA	MARKETING