

PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

Technical Operations

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 38, Cilangkap, Tapos, Depok, 16458
Phone : (62 21) 875 25 83

a. Nama Bahan Kemasan <i>(Packaging Material Name)</i>	: LEAFLET COUNTERPAIN PXM	h. Kode Warna : <i>(Color code)</i>								
b. Kode Bahan Kemasan <i>(Packaging Material Code No)</i>	: D096F (TPI/D096F/C-0821)									
c. Negara <i>(Country)</i>	: Indonesia									
d. Tanggal Pembuatan <i>(Date of Preparation)</i>	: 19 Aug 2021/ Rev. 01									
e. Ukuran (P X L) <i>(Dimension : W X H)</i>	: 90 x 210 mm									
f. Tipe Material & Coating <i>(Type of Material & Coating)</i>	: HVS 60 gsm / Coating : -	<table><tr><td>Warna Utama <i>(Main Color)</i></td><td> Black</td></tr><tr><td>Warna turunan <i>(Derivation color)</i></td><td>-</td></tr><tr><td>Warna Gradasi <i>(Gradient color)</i></td><td>-</td></tr><tr><td>Gambar <i>(Images)</i></td><td>-</td></tr></table>	Warna Utama <i>(Main Color)</i>	Black	Warna turunan <i>(Derivation color)</i>	-	Warna Gradasi <i>(Gradient color)</i>	-	Gambar <i>(Images)</i>	-
Warna Utama <i>(Main Color)</i>	Black									
Warna turunan <i>(Derivation color)</i>	-									
Warna Gradasi <i>(Gradient color)</i>	-									
Gambar <i>(Images)</i>	-									
g. Ukuran Huruf (minimal) <i>(Min. Point size)</i>	: Helvetica Regular: 5.0 pt, Helvetica Bold: 3.48 pt. Century 725 BT Black: 13.0 pt.	(Note : CMYK color based on Color chart) i. Dibuat oleh : Packaging Development <i>(Prepared by)</i>								

Scale 100%

Counterpain® PXM → 15.5 pt
piroxicam, methyl salicylate, → 13 pt
menthol, eugenol

% Generic Name/Brand Name
= (13 pt / 15.5 pt) x 100%
= 83.8 %

Texts	Font Type	Font Size
PT TAISSO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.	Special Font	58.443 x 1.909 mm
Counterpain®	Century 725 BT Black	15,5 pt
piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol	Century 725 BT Black	13,0 pt
PXM	Special Font*	10.936 x 4.339 mm
All texts	Helvetica Bold & Regular	5.5 pt
P No. 3 Awasi Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	Helvetica Bold	3.48 pt
Codification texts (Film #, supplier code week & year of printing, code no of repro)	Helvetica Regular	5,0 pt
Folded Type: Horizontal: 3 X	Pharmacode & Visual code: 12	Software: <i>Adobe Illustrator CS6</i>

* For Special Fonts, dimension refer to WxH based on transform in Ai software preview.

TPI/D096F/C-0821

PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

Counterpain® PXM

piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol

KOMPOSISI

Setiap gram Counterpain® PXM mengandung zat-zat aktif: piroxicam 5 mg, methyl salicylate 102 mg, l-menthol 54,3 mg, eugenol 13,7 mg dalam gel dasar Counterpain®.

DESKRIPSI

Piroxicam merupakan zat anti-inflamasi non-steroid N-heterosiklik carboxamida 1,2-benzothiazin-1,1-diksoida.

CARA KERJA OBAT

Counterpain® PXM mempunyai khasiat anti inflamasi non-steroid dengan sifat analgesik.

Counterpain® PXM bekerja dengan cara menghambat biosintesa prostaglandin melalui penghambatan yang reversibel terhadap enzim siklooksigenase.

INDIKASI

Berbagai keadaan yang disertai dengan rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoarthritis (arthrosis, penyakit sendi degeneratif), gangguan muskuloskeletal post-traumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosynovitis, periarthritis, keseleo, tegang otot dan sakit punggung ruas bawah. Counterpain® PXM juga memberikan rasa hangat yang meresap dengan segera. (Karena formula dasar Counterpain®).

KONTRAINDIKASI

Pasien yang hipersensitif terhadap piroxicam. Sensitivitas silang terhadap asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid lainnya. Pasien yang menderita asma, rinitis, angiodema atau urtikaria akibat asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid.

PERINGATAN

Untuk mencegah toksisitas aditif, hindari pemakaian piroxicam dalam bentuk dosis lain secara bersamaan.

Penggunaan saat kehamilan dan menyusui:

Keamanan penggunaan Counterpain® PXM pada saat kehamilan atau menyusui belum diketahui. Counterpain® PXM menghalangi sintesis prostaglandin dan dilepaskan melalui hambatan bolak-balik enzim siklooksigenase. Efek ini, seperti agen anti-inflamasi lainnya, diasosiasikan dengan peningkatan terjadinya distosia dan penurunan parturisi pada kehamilan hewan bila penggunaan obat ini diteruskan saat kehamilan tingkat lanjut. Obat anti-inflamasi non-steroid juga dapat menginduksi penutupan duktus arteriosus pada bayi. Studi awal mengindikasikan ditemukannya piroxicam pada air susu ibu pada konsentrasi 1% setelah pemakaian oral.

Counterpain® PXM tidak dianjurkan untuk ibu menyusui.

PERHATIAN

Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi lokal. Hindari kontak dengan mata, membran mukus atau pada kulit yang terluka.

DOSIS & PENGGUNAAN

Counterpain® PXM hanya untuk pemakaian luar. Jangan digunakan dalam pembalut oklusif. Oles gel secara merata pada kulit. Satu gram gel (setara dengan 5 mg piroxicam) dioleskan pada tempat yang sakit 3 hingga 4 kali sehari.

EFEK SAMPING

Jarang dilaporkan efek samping akibat pemakaian Counterpain® PXM. Sebagian besar efek samping menyangkut iritasi lokal ringan atau sedang, eritema, ruam, deskuamasi pitiroid, pruritus dan reaksi setempat pada tempat nyeri. Perubahan warna kulit sementara dan noda pada pakaian ditemukan bila gel tidak dioleskan secara merata.

PENYIMPANAN

Simpan dibawah suhu 30°C, lindungi dari cahaya.

No. Reg.: DTL1124403528A1

P No. 3
Awasi Otot Keras
Hanya untuk bagian luar badan

Dibuat oleh:

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.

Depok - Indonesia

Under authority of

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

Tokyo, Japan.

Supplier code week and year of printing
Code no of repro

TPI/D096F/C-0821

PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

Counterpain® PXM

piroxicam, methyl salicylate, menthol, eugenol

KOMPOSISI

Setiap gram Counterpain® PXM mengandung zat-zat aktif: piroxicam 5 mg, methyl salicylate 102 mg, Menthol 54,3 mg, eugenol 13,7 mg dalam gel dasar Counterpain®.

DESKRIPSI

Piroxicam merupakan zat anti-inflamasi non-steroid N-heterosiklik carboxamide 1,2-benzothiazin-1,1-diksoida.

CARA KERJA OBAT

Counterpain® PXM mempunyai khasiat anti inflamasi non-steroid dengan sifat analgesik.

Counterpain® PXM bekerja dengan cara menghambat biosintesa prostaglandin melalui penghambatan yang reversibel terhadap enzim siklooksigenase.

INDIKASI

Berbagai keadaan yang disertai dengan rasa nyeri dan inflamasi, seperti osteoarthritis (arthrosis, penyakit sendi degeneratif), gangguan muskuloskeletal post-traumatik atau akut termasuk tendinitis, tenosynovitis, periarthritis, keseleo, tegang otot dan sakit punggung ruas bawah. Counterpain® PXM juga memberikan rasa hangat yang meresap dengan segera. (Karena formula dasar Counterpain®).

KONTRAINDIKASI

Pasien yang hipersensitif terhadap piroxicam. Sensitivitas silang terhadap asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid lainnya. Pasien yang menderita asma, rinitis, angiodema atau urtikaria akibat asam asetilsalisilat dan obat anti-inflamasi non-steroid.

PERINGATAN

Untuk mencegah toksisitas aditif, hindari pemakaian piroxicam dalam bentuk dosis lain secara bersamaan.

Penggunaan saat kehamilan dan menyusui:

Keamanan penggunaan Counterpain® PXM pada saat kehamilan atau menyusui belum diketahui. Counterpain® PXM menghalangi sintesis prostaglandin dan dilepaskan melalui hambatan bolak-balik enzim siklooksigenase. Efek ini, seperti agen anti-inflamasi lainnya, diasosiasikan dengan peningkatan terjadinya distosia dan penundaan parturisi pada kehamilan hewan bila penggunaan obat ini diteruskan saat kehamilan tingkat lanjut. Obat anti-inflamasi non-steroid juga dapat menginduksi penutupan duktus arteriosus pada bayi. Studi awal mengindikasikan ditemukannya piroxicam pada air susu ibu pada konsentrasi 1% setelah pemakaian oral.

Counterpain® PXM tidak dianjurkan untuk ibu menyusui.

PERHATIAN

Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi lokal. Hindari kontak dengan mata, membran mukus atau pada kulit yang terluka.

DOSIS & PENGGUNAAN

Counterpain® PXM hanya untuk pemakaian luar. Jangan digunakan dalam pembalut oklusif. Oles gel secara merata pada kulit. Satu gram gel (setara dengan 5 mg piroxicam) dioleskan pada tempat yang sakit 3 hingga 4 kali sehari.

EFEK SAMPIING

Jarang dilaporkan efek samping akibat pemakaian Counterpain® PXM. Sebagian besar efek samping menyangkut iritasi lokal ringan atau sedang, eritema, ruam, deskuamasi pitiroid, pruritus dan reaksi setempat pada tempat nyeri. Perubahan warna kulit sementara dan noda pada pakaian ditemukan bila gel tidak dioleskan secara merata.

PENYIMPANAN

Simpan dibawah suhu 30°C, lindungi dari cahaya.

No. Reg.: DTL1124403528A1

P No. 3
Awasi Obat Keras
Hanya untuk bagian luar badan

Dibuat oleh:

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.

Depok - Indonesia

Under authority of

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

Tokyo, Japan.

Supplier code week and year of printing
Code no of repro

Keterangan :
"Supplier code, week & year of printing"
 akan berubah setiap naik cetak (sesuai PO)
 Contoh :
 Estimasi cetak tanggal : 11 - 17 Jan 2021, maka :
 Minggu ke : 02 (dihitung dari awal tahun 2021)
 Tahun cetak : 21
 Misal Kode supplier : SP
 Jadi penulisan modifikasi di proof print adalah :
SP0221
 ~ Ukuran dan font huruf, silahkan lihat di tabel
 ~ Lokasi & warna teks disesuaikan dengan approved artwork ex TPI
Note:
"Supplier code, week & year of printing"
 will be change every printed (based on PO)
 Sample :
 Printed estimation on 11 - 17 Jan 2021,
 so it's mean :
 Week # : 02
 Year : 21
 for example, **Supplier code : SP**
 So the codification written in proof print is
SP0221
 ~ Font type & font size, following the table
 ~ Location & color of texts, following approved artwork ex TPI

View 100%

Approved by:						
Technical Services	Regulatory	Medical Affairs	Marketing	Value Stream	Quality Control	Quality Assurance
				ID : EREG10002012500122		

DISETUJUI OLEH BPOM : 23/04/2026

ID : EREG10002012500122