

EXELON® Patch (rivastigmin)

Transdermal Patch 4,6 mg/24 jam (Exelon® Patch 5)

Transdermal Patch 9,5 mg/24 jam (Exelon® Patch 10)

Informasi Produk Untuk Pasien

Bacalah brosur ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan obat ini

Simpan brosur ini. Anda mungkin akan membutuhkan brosur ini untuk dibaca kembali.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, harap hubungi dokter, apoteker atau tenaga kesehatan.

Obat ini diresepkan hanya untuk Anda. Jangan gunakan obat ini untuk penyakit lain; jangan berikan obat ini kepada orang lain karena dapat membahayakan mereka, meskipun gejala penyakitnya serupa dengan gejala penyakit Anda.

Jika terjadi efek samping yang parah atau Anda mengalami efek samping lain yang tidak tertera pada brosur ini, mohon hubungi dokter, apoteker atau tenaga kesehatan.

Apa isi brosur ini

- 1 Apa itu EXELON® Patch dan apa kegunaannya
- 2 Apa yang harus Anda ketahui sebelum dan selama menggunakan Exelon Patch
- 3 Cara penggunaan Exelon Patch
- 4 Efek samping yang mungkin terjadi
- 5 Cara penyimpanan Exelon Patch
- 6 Isi kemasan dan Informasi lainnya

1 Apa itu EXELON® Patch dan apa kegunaannya

Apa itu Exelon® Patch

Exelon termasuk dalam golongan obat yang disebut penghambat kolinesterase. Zat aktif Exelon adalah rivastigmin.

Apa kegunaan Exelon Patch

Exelon digunakan untuk pengobatan gangguan memori dan demensia pada pasien dengan penyakit Alzheimer atau dengan penyakit Parkinson.

Pada pasien demensia terkait-Alzheimer atau terkait-Parkinson, terdapat sel-sel saraf otak tertentu yang mati, mengakibatkan rendahnya kadar neurotransmitter yang dinamakan asetilkolin (zat yang membuat sel-sel saraf mampu berkomunikasi satu sama lain). Rivastigmin bekerja dengan cara memblokir enzim-enzim yang mengurai asetilkolin: asetilkolinesterase dan butirilkolinesterase. Dengan memblokir enzim-enzim ini, kadar asetilkolin di otak meningkat, sehingga membantu meredakan gejala-gejala demensia terkait-Alzheimer atau terkait-Parkinson.

2 Apa yang harus Anda ketahui sebelum dan selama menggunakan Exelon Patch

Ikuti petunjuk dokter Anda secara saksama. Informasi yang Anda terima dari dokter mungkin berbeda dengan informasi umum yang terdapat pada brosur ini.

Baca informasi berikut sebelum Anda menggunakan Exelon Patch.

Jangan gunakan Exelon Patch

- Jika Anda tahu bahwa Anda memiliki alergi (hipersensitif) terhadap rivastigmin (zat aktif dalam Exelon Patch) atau kandungan lain yang tercantum pada bagian akhir brosur ini.
- Jika Anda pernah mengalami reaksi alergi terhadap jenis obat serupa (turunan karbamat).
- Jika Anda mengalami reaksi kulit yang telah menyebar melebihi ukuran *patch*, jika ada reaksi lokal yang lebih intens (seperti lepuhan, memberatnya peradangan kulit, pembengkakan) dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu 48 jam setelah *transdermal patch* dilepas.

Jika salah satu kondisi berikut terjadi pada Anda, **jangan gunakan Exelon Patch dan beritahukan kepada dokter Anda.**

Peringatan dan Perhatian

- Jika Anda mengalami reaksi saluran cerna, seperti mual, muntah, dan diare. Anda dapat mengalami dehidrasi (kehilangan terlalu banyak cairan) jika muntah atau diare berkepanjangan
- Jika Anda sedang atau pernah mengalami detak jantung yang tidak teratur atau cepat
- Jika Anda sedang atau pernah mengalami tukak lambung aktif
- Jika Anda sedang atau pernah mengalami kesulitan buang air kecil
- Jika Anda sedang atau pernah mengalami kejang
- Jika Anda sedang atau pernah mengalami asma atau penyakit pernapasan yang parah
- Jika Anda mengalami gemetar
- Jika Anda memiliki berat badan yang rendah (kurang dari 50 kg)
- Jika Anda mengalami gangguan fungsi hati

Jika salah satu dari ini berlaku untuk Anda, dokter Anda mungkin perlu melakukan monitoring lebih ketat saat Anda menggunakan obat ini.

Segera beri tahu dokter jika Anda mengalami peningkatan dan penyebaran peradangan, pelecetan atau pembengkakan pada kulit.

Jika Anda sudah tidak menggunakan Exelon Patch selama lebih dari beberapa hari, jangan gunakan patch berikutnya sebelum Anda berkonsultasi dengan dokter Anda

Penggunaan obat lain (interaksi dengan obat-obatan lain, termasuk vaksin atau produk biologis)

Beri tahu dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan Anda jika Anda sedang atau pernah menggunakan obat-obatan lain, termasuk obat-obatan yang didapatkan tanpa resep dokter.

Exelon Patch tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat lain dengan efek yang serupa (agen kolinomimetik) atau dengan obat antikolinergik (seperti obat yang digunakan untuk meredakan kram atau spasme lambung atau obat pencegah mabuk perjalanan).

Exelon Patch tidak boleh diberikan bersamaan dengan metoklopramid (obat yang digunakan untuk meredakan atau mencegah mual dan muntah). Penggunaan bersama obat-obat ini dapat menimbulkan efek aditif, seperti tungkai kaku atau tangan gemetar.

Jika Anda harus menjalani operasi pada saat menggunakan Exelon Patch, Anda harus memberi tahu dokter Anda karena Exelon Patch dapat memperkuat efek relaksan otot tertentu selama anestesi.

Hati-hati bila Exelon Patch digunakan bersamaan dengan obat golongan penghambat-beta (seperti atenolol, yang digunakan untuk mengobati hipertensi, angina, dan gangguan jantung lainnya). Penggunaan bersama obat golongan ini dapat menimbulkan efek aditif, seperti bradikardia (detak jantung melambat) yang dapat menyebabkan sinkop (pingsan, kehilangan kesadaran).

Hati-hati bila Exelon Patch digunakan bersamaan dengan obat yang diketahui dapat memperpanjang sistem kelistrikan jantung (interval QT), termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kuinidin (obat yang digunakan untuk mengobati detak jantung tidak teratur), amiodaron (obat yang digunakan untuk mengobati ketidakaturan detak jantung yang serius/fatal), pimozid (obat yang bekerja pada sistem saraf pusat), halofantrin (obat antimalaria), sisaprid (obat yang digunakan untuk mengobati gejala nyeri ulu hati di malam hari), sitalopram (obat yang digunakan untuk mengobati depresi), mizolastin (obat antihistamin), obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri (seperti moksifloksasin, eritromisin). Dokter Anda juga dapat memantau kondisi klinis Anda sesuai kebutuhan.

Anak dan remaja (di bawah usia 18 tahun)

Penggunaan Exelon Patch pada anak dan remaja tidak dianjurkan.

Pasien usia lanjut (usia 65 tahun ke atas)

Exelon Patch dapat digunakan oleh pasien berusia 65 tahun ke atas.

Exelon Patch dengan makanan dan minuman

Makanan atau minuman tidak memengaruhi Exelon Patch karena rivastigmin masuk ke aliran darah Anda melalui kulit.

Kehamilan dan menyusui

Jika Anda sedang hamil, kebermanfaatan Exelon Patch harus benar-benar dipertimbangkan, apakah lebih besar dibandingkan dengan potensi risikonya terhadap janin.

Beri tahu dokter Anda jika Anda sedang hamil atau berencana untuk hamil.

Mintalah saran dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan Anda sebelum menggunakan obat apa pun selama kehamilan.

Anda tidak boleh menyusui selama pengobatan dengan Exelon Patch.

Mintalah saran dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan Anda sebelum menggunakan obat apa pun selama Anda menyusui.

Mengemudi dan mengoperasikan mesin

Dokter Anda akan memberi tahu apakah penyakit Anda memungkinkan Anda untuk mengemudi dan mengoperasikan mesin dengan aman. Exelon Patch dapat menyebabkan pusing dan mengantuk, terutama pada awal pengobatan atau saat peningkatan dosis. Oleh karena itu, Anda harus memahami efek apa yang dapat ditimbulkan oleh Exelon Patch sebelum menjalani aktivitas tersebut. Jika Anda merasa pusing atau mengantuk, jangan mengemudi, mengoperasikan mesin, atau melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kewaspadaan Anda.

3 Cara penggunaan Exelon Patch

Anda harus menggunakan obat ini sesuai petunjuk dokter atau apoteker. Tanyakan kepada dokter, apoteker atau tenaga kesehatan Anda jika Anda tidak yakin bagaimana menggunakan obat ini.

Jangan melebihi dosis yang direkomendasikan oleh dokter Anda.

Berapa dosis Exelon Patch yang harus Anda gunakan

PENTING: Gunakan satu *patch* dalam satu waktu. Anda harus melepaskan Exelon Patch yang Anda gunakan sebelumnya, sebelum menggunakan yang baru. Jangan memotong *patch* menjadi beberapa bagian.

Bagaimana memulai pengobatan

Dokter Anda akan memberi tahu Anda Exelon Patch mana yang lebih cocok untuk Anda. Pengobatan biasanya diawali dengan Exelon Patch 5 (4,6 mg/24 jam). Dosis harian yang biasa digunakan adalah Exelon Patch 10 (9,5 mg/24 jam).


- Hanya satu *patch* yang boleh digunakan dalam satu waktu dan *patch* harus diganti dengan yang baru setelah 24 jam.

Selama masa pengobatan, dokter Anda dapat menyesuaikan dosis sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda sudah tidak menggunakan Exelon Patch selama lebih dari beberapa hari, jangan gunakan *patch* berikutnya sebelum Anda berkonsultasi dengan dokter Anda.

Dimana menggunakan Exelon Patch

- Sebelum Anda menggunakan Exelon Patch, pastikan kulit Anda:
 - bersih, kering, dan tidak berbulu
 - bebas dari adanya bedak, minyak, pelembab, atau *lotion* (yang dapat mencegah *patch* menempel pada kulit Anda dengan baik)
 - bebas dari luka, ruam dan/atau iritasi.
- Setiap 24 jam, lepaskan Exelon Patch yang ada dengan lembut sebelum menggunakan *patch* yang baru. Menggunakan banyak *patch* di tubuh Anda dapat meningkatkan paparan dalam jumlah berlebih yang berpotensi membahayakan Anda.
- Gunakan **HANYA SATU** *patch* per hari, dan **HANYA PADA SATU** lokasi berikut (ditunjukkan pada gambar di bawah ini):
 - lengan atas, sisi kiri **atau** kanan, **atau**
 - dada, sisi kiri **atau** kanan, **atau**
 - punggung atas, sisi kiri **atau** kanan, **atau**
 - punggung bawah, sisi kiri **atau** kanan.

Hindari tempat-tempat dimana *patch* dapat tergesek oleh pakaian yang ketat.



Saat mengganti *patch*, Anda harus melepas *patch* yang Anda gunakan sebelumnya, sebelum menggunakan *patch* yang baru ke area kulit yang berbeda (misalnya, di sisi kanan tubuh Anda satu hari, lalu di sisi kiri keesokan harinya). Namun, *patch* dapat digunakan berturut-turut pada area anatomi umum yang sama (misalnya, jika *patch* pertama diterapkan pada lengan kanan


atas, *patch* berikutnya dapat diterapkan pada lengan kiri atas atau ke tempat lain di lengan kanan atas). Jangan gunakan *patch* baru ke area kulit yang sama setidaknya selama satu minggu.

Bagaimana cara menggunakan Exelon Patch


Patch merupakan bahan plastik yang tipis, *opaque*, yang menempel pada kulit. Setiap *patch* disegel dalam kemasan *sachet* yang melindunginya sampai siap untuk digunakan. Jangan membuka *sachet* atau mengeluarkan *patch* sampai tepat sebelum Anda menggunakannya.

Setiap 24 jam, lepaskan Exelon Patch yang ada dengan lembut sebelum menggunakan *patch* yang baru. Menggunakan banyak *patch* di tubuh Anda dapat meningkatkan paparan dalam jumlah berlebih yang berpotensi membahayakan Anda.


- Setiap *patch* disegel dalam masing-masing kemasan *sachet*. Anda hanya boleh membuka *sachet* saat Anda siap untuk menggunakannya.
- Sobek atau potong *sachet* pada bagian takik dan keluarkan *patch*.




- Terdapat lapisan yang melindungi sisi perekat *patch*. Lepaskan salah satu sisi lapisan pelindung dan jangan menyentuh bagian *patch* yang lengket dengan jari.



- Letakkan *patch* dengan sisi yang lengket di sisi atas atau bawah punggung, lengan atas, atau dada lalu lepaskan sisi kedua lapisan pelindung.



- Kemudian tekan *patch* dengan kuat di area penempelan **setidaknya selama 30 detik menggunakan telapak tangan** untuk memastikan seluruh bagian *patch* menempel dengan baik.




- Jika dapat membantu Anda, Anda dapat menulis (misalnya, nama hari pada minggu tersebut) pada Exelon Patch dengan pulpen tipis.

Exelon Patch harus digunakan terus menerus sampai tiba waktunya untuk penggantian dengan *patch* baru. Anda boleh jadi ingin mencoba area penempelan yang berbeda saat menggunakan *patch* baru, untuk menemukan area yang paling nyaman bagi Anda dan area tempat pakaian Anda tidak akan bergesekan dengan *patch*.

Cara melepaskan Exelon Patch

Tarik salah satu tepi Exelon Patch secara perlahan untuk melepaskannya dari kulit.



Jika sisa perekat tertinggal di kulit Anda, bilas area tersebut dengan lembut menggunakan air hangat dan sabun yang ringan atau gunakan *baby oil* untuk menghilangkannya. Jangan gunakan Alkohol atau cairan pelarut lainnya (misalnya, penghapus cat kuku atau pelarut lain).

Cara membuang Exelon Patch

Setelah *patch* dilepas, lipat menjadi dua bagian dengan sisi perekat di bagian dalam dan lekatkan menjadi satu. Masukkan kembali *patch* bekas pakai ke dalam kemasan *sachet* aslinya dan buang dengan aman jauh dari jangkauan dan pandangan anak-anak. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air setelah membuang *patch*. Jika terkena mata atau jika mata memerah setelah membuang *patch*, segera bilas dengan air dan hubungi tim medis apabila gejala tidak membaik.

Apakah *patch* dapat digunakan saat mandi, berenang, atau di bawah sinar matahari?

- Penggunaan *patch* tidaklah terpengaruh pada saat mandi atau berenang. Saat berenang, *patch* dapat digunakan di dalam pakaian renang Anda. Pastikan *patch* tidak kendur/lepas selama aktivitas ini.
- *Patch* tidak boleh terpajan sumber-sumber panas eksternal (sinar matahari yang berlebihan, sauna, solarium) dalam jangka waktu lama.

Apa yang harus dilakukan jika Exelon Patch jatuh

Jika *patch* jatuh, gunakan *patch* baru selama sisa waktu yang ada, lalu ganti *patch* dikeesokan harinya pada waktu yang sama seperti biasanya.

Kapan dan berapa lama Exelon Patch digunakan

Untuk mendapatkan manfaat dari pengobatan, Anda harus menggunakan *patch* baru setiap hari. Penggunaan Exelon pada waktu yang sama setiap hari akan membantu Anda mengingat waktu rutin penggunaannya. Hanya gunakan satu Exelon Patch pada satu waktu dan ganti dengan *patch* yang baru setelah 24 jam.

Beri tahu perawat Anda bahwa Anda sedang menggunakan Exelon Patch. Beri tahu juga perawat Anda apabila Anda belum menggunakan Exelon Patch selama lebih dari beberapa hari.

Sebelum mulai digunakan, obat ini hanya dapat diresepkan oleh dokter spesialis dan manfaat pengobatan perlu dinilai secara berkala. Dokter Anda juga akan memantau berat badan Anda selama Anda menggunakan obat ini.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang berapa lama Exelon digunakan, bicarakan dengan dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan Anda.

Apabila Anda menggunakan lebih banyak Exelon Patch daripada yang seharusnya

Apabila Anda secara tidak sengaja menggunakan lebih dari satu Exelon Patch, lepaskan semua Exelon Patch dari kulit Anda, lalu beri tahu dokter Anda bahwa Anda secara tidak sengaja menggunakan lebih dari satu Exelon Patch. Anda mungkin memerlukan perhatian medis. Beberapa orang yang secara tidak sengaja menggunakan Exelon terlalu banyak mengalami mual, muntah, diare, tekanan darah tinggi, dan halusinasi. Detak jantung lambat dan pingsan juga dapat terjadi.

Apabila Exelon Patch terlewat digunakan

Apabila Anda terlewat menggunakan Exelon Patch Anda, segera gunakan *patch* yang baru. Anda dapat menggunakan *patch* berikutnya pada waktu seperti biasa di keesokan harinya. Jangan gunakan dua Exelon patch untuk menebus *patch* yang Anda lewatkan.

Apabila Anda berhenti menggunakan Exelon

Jangan berhenti menggunakan Exelon Patch atau mengubah dosis Anda tanpa berbicara dengan dokter Anda.

Jika Anda belum menggunakan Exelon Patch selama lebih dari beberapa hari, jangan gunakan *patch* berikutnya sampai Anda berbicara dengan dokter Anda.

4 Efek samping yang mungkin terjadi

Seperti halnya semua obat, pasien yang diobati dengan Exelon Patch mungkin mengalami efek samping, meskipun tidak pada semua pasien.

Jangan khawatir dengan daftar efek samping yang mungkin terjadi di bawah ini. Anda mungkin tidak mengalami salah satu dari mereka.

Anda mungkin cenderung melihat efek samping lebih sering ketika Anda memulai pengobatan atau meningkatkan ke dosis yang lebih tinggi. Dalam kebanyakan kasus, efek samping akan berangsur-angsur hilang saat tubuh Anda terbiasa dengan obat.

Beberapa efek samping dapat bersifat serius

Segera **lepaskan Exelon Patch dan beritahukan dokter Anda** jika Anda mengalami salah satu dari efek samping yang tercantum di bawah ini.

Umum: *dapat memengaruhi hingga 1 per 10 orang*

- depresi

Jarang terjadi: *dapat memengaruhi hingga 1 per 100 orang*

- kehilangan terlalu banyak cairan (dehidrasi)
- kebingungan derajat berat
- melihat, merasakan, atau mendengar hal-hal yang tidak ada (halusinasi)
- kehilangan koordinasi, kesulitan berbicara, dan tanda-tanda gangguan otak (*stroke*)
- pingsan
- detak jantung tidak teratur/cepat/lambat (masalah pada irama jantung)
- darah pada tinja atau saat muntah (tukak lambung dan perdarahan saluran cerna)

Sangat jarang: *dapat memengaruhi hingga 1 per 10.000 pasien*

- nyeri perut berat di lambung bagian atas, seringkali disertai mual dan muntah (radang pankreas)
- kejang

Frekuensi tidak diketahui:

- kulit dan bagian putih mata menguning, warna urin menggelap abnormal, atau mual, muntah, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan yang tidak dapat dijelaskan (gangguan hati)
- kulit meradang, melepuh atau membengkak, yang makin parah dan menyebar
- Tungkai kaku, tangan gemetar (gejala ekstrapiramidal)

Kemungkinan efek samping lainnya

Sangat umum: *dapat memengaruhi lebih dari 1 per 10 orang*

- merasa tidak enak badan (reaksi saluran cerna, seperti mual)

Umum: *dapat memengaruhi hingga 1 per 10 orang*

- kehilangan nafsu makan
- kecemasan
- kesulitan tidur
- pusing
- sakit kepala
- muntah
- diare

- begah setelah makan
- nyeri lambung
- ketidakmampuan untuk menahan buang air kecil (inkontinensia urin)
- kemerahan, gatal, iritasi, pembengkakan pada tempat penempelan *patch* (reaksi kulit pada lokasi penempelan)
- lelah
- lemah
- penurunan berat badan
- infeksi pada bagian tubuh yang menghasilkan urin (infeksi saluran kemih)

Tidak umum: *dapat memengaruhi hingga 1 per 100 orang*

- gaduh gelisah
- mudah marah
- mengantuk (umumnya pada pasien etnis Cina)
- banyak beraktivitas yang tidak lazim, seolah tidak mengenal rasa lelah (hiperaktif)
- berkeringat
- merasa kurang enak badan

Jarang: *dapat memengaruhi hingga 1 per 1,000 orang*

- tekanan darah tinggi
- ruam dan gatal atau kulit memerah saat bersentuhan dengan *patch* (sangat umum pada pasien etnis Jepang)
- gatal
- ruam
- kulit memerah
- melepuh
- peradangan kulit disertai ruam
- jatuh

Sangat jarang: *dapat memengaruhi hingga 1 per 10,000 orang*

- kekakuan otot, kesulitan dalam melakukan gerakan (tanda perburukan penyakit Parkinson)

Frekuensi tidak diketahui:

- hiperaktif
- perubahan hasil tes fungsi hati
- gemetar
- bermimpi buruk

Informasi tambahan untuk pasien dengan penyakit Parkinson

Beberapa efek samping yang lebih sering terjadi pada pasien demensi terkait penyakit Parkinson: jatuh (sangat umum); gaduh gelisah, mudah marah, halusinasi, mengantuk, kekakuan otot, tekanan darah tinggi, dan kehilangan terlalu banyak cairan (dehidrasi) (umum).

Beberapa efek samping tambahan atau lebih sering diamati pada pasien demensia terkait penyakit Parkinson: gemetar, munculnya gejala-gejala yang mirip dengan tanda perburukan penyakit Parkinson (keterbatasan gerakan otot yang tidak normal, gerakan lambat yang tidak normal, gerakan mulut, lidah, dan tungkai yang tidak terkendali) dan gaya berjalan yang tidak normal (umum).

Jika Anda mengalami salah satu dari gejala di atas dan dirasa sangat mengganggu, **beri tahu dokter Anda.**

Pelaporan efek samping

Apabila ada keluhan efek samping atau kondisi tidak nyaman selama dan setelah penggunaan obat, konsultasikan ke dokter, apoteker, atau perawat. Anda dapat juga melaporkan keluhan efek samping atau kondisi tidak nyaman tersebut secara langsung ke Industri Farmasi melalui kontak berikut:

Novartis Indonesia

Website: www.novartis.com/report

Dengan melaporkan efek samping, Anda dapat membantu memberikan informasi lebih lanjut mengenai keamanan obat ini.

5 Cara penyimpanan Exelon Patch

- Jauhkan obat ini dari pandangan dan jangkauan anak-anak.
- Jangan gunakan Exelon Patch setelah melewati tanggal kedaluwarsa yang tertera pada dus dan *sachet*.
- Jangan gunakan Exelon Patch yang rusak atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
- Jangan simpan Exelon Patch pada suhu di atas 30°C.

6 Isi kemasan dan Informasi lainnya

Apakah kandungan Exelon Patch

- Zat **aktif** dari Exelon Patch adalah rivastigmin.
Exelon Patch 5: setiap 5 cm² transdermal patch mengandung 9 mg rivastigmin. Tingkat pelepasan yaitu 4,6 mg/24 jam.
Exelon Patch 10: setiap 10 cm² transdermal patch mengandung 18 mg rivastigmin. Tingkat pelepasan yaitu 9,5 mg/24 jam.
- **Kandungan lain dari Exelon Patch** adalah *Vitamin E, poly butylmethacrylate, methyl-methacrylate, acrylic copolymer, silicone oil (Ph. Eur.)*.

Bagaimana bentuk dan isi kemasan Exelon Patch

Exelon Patch merupakan *matrix-type* transdermal patch yang tipis yang terdiri atas tiga lapisan. Bagian luar lapisan pendukung (*backing layer*) berwarna *beige* dan masing-masing diberi label dengan kode:

- untuk Exelon Patch 5: "AMCX",
- untuk Exelon Patch 10: "BHDI"

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Besar Kemasan dan Nomor Registrasi

Exelon® Patch 5: Box @ 30 sachets; No. Reg.

Exelon® Patch 10: Box @ 30 sachets; No. Reg.

Diproduksi oleh LTS Lohmann Therapie-Systeme, Germany untuk Novartis Pharma AG,
Basel, Switzerland.

Diimpor oleh PT Novartis Indonesia, Jakarta, Indonesia.

PIL based on BPL v4.1 12-Dec-2022