

Mucopect®

Ambroxol Hydrochloride

MUCOPECT® mengandung ambroksol hidroklorida, yang merupakan obat mukolitik (pengencer dahak) pada penyakit saluran pernapasan akut dan kronik khususnya pada bronkitis kronik eksaserbasi dan bronkitis asmatik.

Sediaan MUCOPECT®	Kekuatan	Deskripsi Produk
Tablet 	30 mg	Tablet bulat berwarna putih dengan kedua sisi rata bertepi miring, satu sisi diberi garis bagi tengah dan tanda '67C' di bagian atas dan bawah, dengan sisi lainnya polos

Zat tambahan:

lactose monohydrate, maize starch dried, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate.

Dosis dan Cara Pemberian MUCOPECT®

Sediaan	Usia	Dosis	Petunjuk Penggunaan
Tablet 30 mg	Dewasa dan anak >12 tahun	1 tablet 2-3 kali sehari	 - Dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan
	Anak usia 6-12 tahun	½ tablet 2-3 kali sehari	 - Jangan digunakan bersamaan dengan obat penekan batuk

Cara Kerja MUCOPECT®

Ambroksol hidroklorida yang terkandung dalam **MUCOPECT®** meningkatkan produksi surfaktan paru dan menstimulasi sekresi saluran napas sehingga dapat melancarkan proses pengeluaran dahak dan memudahkan batuk.



Jangan Gunakan **MUCOPECT®** Jika alergi terhadap ambroksol hidroklorida atau komponen lain dalam formulasi

Perhatikan keadaan berikut pada penggunaan **MUCOPECT®**

- Segera berkonsultasi ke dokter apabila gejala batuk tidak membaik atau semakin memburuk
- Hentikan penggunaan **MUCOPECT®** jika terjadi lecet atau lesi pada kulit atau pada permukaan tubuh lainnya.
- **MUCOPECT®** tidak boleh digunakan jika memiliki gangguan fungsi ginjal atau penyakit hati berat kecuali atas petunjuk dokter
- Hindari penggunaan **MUCOPECT®** jika memiliki intoleransi galaktosa, kekurangan enzim laktase, atau gangguan penyerapan gula (glukosa-galaktosa) karena obat ini mengandung laktosa

Penggunaan MUCOPECT® pada Ibu Hamil dan Menyusui



Penggunaan **MUCOPECT®** pada kehamilan harus atas petunjuk dokter.



MUCOPECT® tidak dianjurkan digunakan pada ibu menyusui.



Tidak ada studi mengenai efek penggunaan **MUCOPECT®** terhadap kemampuan mengemudi dan mengoperasikan mesin yang pernah dilakukan.

MUCOPECT® dapat mempunyai efek samping yang biasa terjadi seperti mual. Jarang terjadi, berupa reaksi alergi, ruam, biduran (urtikaria), muntah, diare, dispepsia, nyeri perut. Selain itu terdapat kemungkinan efek samping (belum pernah dilaporkan) berupa reaksi alergi berat (anafilaksis), pembengkakan (angioedema), gatal-gatal (pruritus), dan reaksi alergi kulit berat (*erythema multiforme*, *Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis* dan *acute generalized exanthematous pustulosis*).

Pelaporan efek samping

Se segera laporkan apabila Anda mengalami keluhan efek samping atau kondisi tidak nyaman selama dan setelah penggunaan obat kepada farmakovigilans@kalventis.com. Anda dapat membantu memberikan informasi terkait keamanan obat ini.

Tidak terdapat gejala spesifik overdosis yang dilaporkan terjadi pada manusia hingga saat ini. Gejala yang muncul sesuai dengan gejala efek samping **MUCOPECT®**. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera berkonsultasi ke dokter.

Kemasan & Cara Penyimpanan **MUCOPECT®**

Dus, 10 blister @10 tablet

Reg. No. DKL1821207610A1

Simpan di bawah suhu 30° C, terlindung dari cahaya.

Simpan di tempat aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Harus dengan resep dokter.

Diproduksi oleh:

PT Kalventis Sinergi Farma
Jakarta, Indonesia

Di bawah lisensi dari:

Opella Healthcare International SAS, France

Tanggal revisi: April 2026 (CCDS V1)

Opella.

