Batch Number
Mfg Date
Exp Date
HET



DISETUJUI OLEH BPOM: 12/06/2026

ID: EREG100374VR12600037

100.5 mm

Pantone 348C
Pantone 362C

Cov cover **Mylanta**

Pantone 288C
Pantone 325C
P.359C
Hitam

1

5,9mm

4,7mm

46 mm

46 mm

Mylanta

Aluminium Hydroxide 200 mg
Magnesium Hydroxide 200 mg
Simethicone 20 mg

ANTASID - OBAT MAAG

MEREDAKAN GEJALA SAKIT MAAG KARENA ASAM LAMBUNG BERLEBIH SEPERTI PERIH DAN MUAL

isi 1 blister @ 10 tablet kunyah

Tablet kunyah dengan rasa spearmint

RASA MINT

HALAL INDONESIA
ID00410000086971220

BPOM RI

DBL1441200163A1

NA. REG: DBL1441200163A1
HET, No. Batch, dan Batas Kadaluarsa lihat blister.
KOMPOSISI:
Tiap tablet kunyah mengandung
Aluminium hydroxide gel kering.....200 mg
Magnesium hydroxide.....200 mg
Simethicone.....20 mg
DESKRIPSI OBAT: Tablet pipih berwarna kuning dengan tepi bevel. Monogram M tercetak pada satu sisi dan G pada sisi yang lain dan tidak terlihat kontaminan.
DAFTAR EKSIPIEN: Corn Starch, Mannitol, Lactose Monohydrate, Low-Substituted Hydroxypropyl Cellulose, Magnesium Stearate, Saccharin Sodium, Spearmint Flavour, Quinoline Yellow CI 47005 E104 (DYE), Sunset Yellow FCF CI 15985 (DYE), Purified Water.
CARA KERJA OBAT: Kombinasi Aluminium hydroxide dan Magnesium hydroxide merupakan antasida yang bekerja menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin, sehingga rasa nyeri ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung dan pepsin berkurang. Di samping itu efek laksatif dari Magnesium hydroxide akan mengurangi efek konstipasi dari Aluminium hydroxide.
CARA PEMAKAIAN: Peroral.
INDIKASI: Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus dan beles jari, dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung dan nyeri ulu hati.

KONTRAINDIKASI: Jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal yang berat, karena dapat menimbulkan hipermagnesia (kadar magnesium dalam darah meningkat). Tidak boleh digunakan pada pasien yang hipersensitif terhadap aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone atau komponen lain dalam formulasi obat ini.
DOSIS: Dewasa : 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Anak-anak 6-12 tahun ½ -1 tablet 3-4 kali sehari. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur, sebaiknya dikunyah dahulu. Kecuali atas petunjuk dokter, tidak dianjurkan digunakan pada anak di bawah 6 tahun dan tidak dianjurkan penggunaan terus menerus lebih dari 2 minggu.
OVERDOSIS: Dosis maksimum untuk aluminium hydroxide 4800 mg setiap 24 jam yang diberikan dalam dosis terbagi; magnesium hydroxide 4800 mg setiap 24 jam yang diberikan dalam dosis terbagi; simethicone 600 mg setiap 24 jam yang diberikan dalam dosis terbagi. Jika terjadi overdosis, segera dapatkan pertolongan medis.
EFEK SAMPING: Efek samping yang umum adalah sembelit, diare, mual, muntah, sensasi terbakar di mulut atau tenggorokan, dysgeusia atau persepsi rasa berubah, reaksi hipersensitifitas termasuk ruam, urtikaria, dan angioedema. Gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan. **LAYANAN KONSUMEN:** konsumen@kenvue.com / 0800-155-4636 (bebas pulsa).
INTERAKSI OBAT: Kecuali atas anjuran dokter, jangan digunakan dalam 2 jam setelah mengkonsumsi obat lain (terutama Simetidin dan Tetrasiklin) dan hindari minuman yang mengandung asam (sari buah, 'wine', dll) karena dapat mempengaruhi penyerapan obat. Pasien harus berkonsultasi ke dokter sebelum menggunakan produk ini bersamaan dengan Raltegravir, Dolutegravir, dan Elvitegravir.
PERINGATAN DAN PERHATIAN: Hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama, karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah. Pasien di atas umur 50 tahun yang mengalami nyeri atau rasa panas di daerah dada untuk pertama kalinya, pasien dengan gangguan ginjal dan *hypermagnesaemia*, dan pasien yang mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan harus konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan produk ini. Hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter jika gejala- gejalanya menetap atau memburuk, timbul gejala baru atau mengalami kesulitan menelan, nyeri pada saat menelan, muntah parah, tinja berwarna hitam, tercekik atau nyeri di dada.
KEHAMILAN DAN MENYUSUI: Konsultasikan dengan dokter sebelum digunakan apabila Anda sedang mengandung atau menyusui.
PENYIMPANAN: Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
DISTRIBUSI OLEH: PT. Integrated Healthcare Indonesia, Jakarta, Indonesia.
DIBUAT LIBERI: Johnson & Johnson, Pte. Ltd., Singapore.

ITEM BARCODE

ITEM CODE

8 992725 051219

DISETUJUI OLEH BPOM: 12/06/2026

ID: EREG100374VR12600037

DISETUJUI OLEH BPOM: 12/06/2026

ID: EREG100374VR12600037