

DRAFT LEAFLET

Canesten®
Klotrimazol 1%
Krim Antijamur
Obat luar

Mengatasi jamur pada kulit, seperti panu, kadas/ kurap, kutu air dan ruam popok.

Cara kerja obat:

Klotrimazol adalah senyawa antifungal dengan spektrum yang luas, digunakan untuk pengobatan infeksi dermal yang disebabkan oleh spesies patogen dari dermatophytes, ragi dan *Malassezia furfur*. Mekanisme kerjanya adalah melawan pembelahan dan pertumbuhan organisme.

Komposisi:

Krim Canesten® mengandung Klotrimazol 1 %.

Indikasi:

Canesten® untuk pengobatan topikal dari kandidiasis yang disebabkan oleh *Candida albicans*, pityriasis versicolor yang disebabkan oleh *Malassezia furfur*, tinea pedis, tinea cruris dan tinea corporis yang disebabkan oleh *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum* dan *Microsporum canis*. Digunakan untuk ruam popok.

Cara pemakaian:

Oleskan krim Canesten® secukupnya pada daerah kulit sakit 2 - 3 kali sehari. Dapat juga digunakan sebagai pengobatan lanjutan untuk mencegah berjangkitnya kembali penyakit jamur pada kulit/ lipatan – lipatan kulit. Perkembangan positif dengan hilangnya rasa gatal biasanya terjadi dalam minggu pertama pengobatan.

Jika tidak memperlihatkan perkembangan positif setelah 4 minggu, maka diagnosa harus diulang.

Peringatan dan perhatian:

Pengobatan harus dihentikan jika terjadi iritasi atau sensitivitas dan diganti dengan obat yang lebih tepat.

Klotrimazol dapat digunakan selama masa kehamilan, berdasarkan petunjuk dari dokter.

Tidak ada data terkait dengan ekskresi klotrimazol ke dalam ASI. Namun, absorpsi sistemik bersifat minimal setelah pemberian secara topikal dan tidak akan menimbulkan efek sistemik.

Klotrimazol dapat digunakan selama masa menyusui. Jika digunakan secara topikal pada area puting, basuhlah payudara sebelum menyusui anak.

Efek samping:

Angioedema, reaksi anafilaksis, hipersensitivitas, hipotensi, *syncope*, *dyspnea*, *blistering*, dermatitis kontak, *erythema*, *paraesthesia*, pengelupasan pada kulit, pruritus, ruam kulit, urtikaria, rasa tersengat pada kulit/ sensasi terbakar, iritasi pada tempat aplikasi, edema, nyeri.

Kontraindikasi:

Hipersensitif terhadap klotrimazol.

Data non-klinis menunjukkan tidak ada bahaya khusus bagi manusia berdasarkan studi konvensional pada keamanan farmakologi, toksisitas dosis berulang, genotoksik, potensi karsinogenik dan toksisitas untuk reproduksi dan pengembangan.

Kemasan:

Tube berisi 5 g dan 10 g krim.

Diproduksi oleh:

PT Genero Pharmaceuticals, Jl. Industri Selatan 1B Blok KK No. 1-2, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550,

Untuk: PT Bayer Indonesia, Jalan Raya Jakarta Bogor Km 32, Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat - Indonesia.

Dengan lisensi dan pengawasan dari Bayer Consumer Care AG, Switzerland

Simpanlah di bawah suhu 25° C.

Jauhkan dari jangkauan anak – anak.

Reg. No. XXX XXX XXX (krim 5g)

Reg. No. XXX XXX XXX (krim 10g)

P. No 3
Awat ! Obat Keras
Hanya untuk bagian luar dari badan