

70 mm

CEDOCARD® 10

Isosorbide Dinitrate 10 mg

UNTUK PENGOBATAN ANGINA PECTORIS DAN GANGGUAN
ANGINA SETELAH INFARK MIOKARD
Tablet

KOMPOSISI

Tiap tablet mengandung :
1,4 : 3,6-dianhydrosorbitol 2,5 dinitrate (isosorbide dinitrate) 10 mg

URAIAN

CEDOCARD® 10 tablet me-relaksasi dinding pembuluh darah dan menurunkan beban jantung, sehingga mencegah serangan angina pectoris. **CEDOCARD® 10** menurunkan venous return ke dalam jantung sehingga akan menurunkan preload pada payah jantung.

INDIKASI

Untuk pengobatan angina pectoris dan gangguan angina setelah infark miokard.
Untuk pencegahan serangan angina pada pasien-pasien yang menderita penyakit jantung koroner menahun.

POSOLOGI

Dewasa : 1-3 tablet 4 kali sehari.
Pemberian **CEDOCARD® 10** per oral akan memberikan efek setelah 20-30 menit, dan khasiatnya akan bertahan selama 4-6 jam.

PERHATIAN

CEDOCARD® 10 harus diberikan dengan hati-hati pada pasien-pasien dengan infark miokard akut dan glaukoma.

EFEK SAMPING

Nyeri kepala yang bersifat sementara.

KONTRAINDIKASI

Hipotensi, syok kardiogenik.
Hipersensitif terhadap isosorbide dinitrate.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER
Simpan pada suhu di bawah 30°C

KEMASAN

Box berisi 60 tablet dalam 6 strip @ 10 tablet
Reg. No. : DKL 9104506710B1

Diproduksi oleh:

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Citeureup, Bogor, Indonesia

Dipasarkan oleh:

Darya-Varia
LABORATORIA

Atas lisensi dari:

Takeda
Takeda Nederland bv
Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp,
The Netherlands

PIN-00000000

CEDOCARD® 10

Isosorbide Dinitrate 10 mg

FOR TREATMENT OF ANGINA PECTORIS AND ANGINAL
DISORDERS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
Tablet

COMPOSITION

Each tablet contains :
1,4 : 3,6-dianhydrosorbitol 2,5 dinitrate (Isosorbide Dinitrate) 10 mg

DESCRIPTION

CEDOCARD® 10 tablet relaxes the muscle wallas of blood vessel and reduces the workload of the heart, in order to prevent attacks of angina.
CEDOCARD® 10 reduces the venous return to the heart and as a consequence the preload in heart failure.

INDICATIONS

For treatment of angina pectoris and anginal disorders after myocardial infarction.
For the prophylaxis of anginal attacks in patients suffering from chronic coronary diseases.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Adult dose : 1 - 3 tablets 4 times daily.
CEDOCARD® 10, when swallowed start to take effect within 20 - 30 minutes, and the action effective for 4 - 6 hours.

PRECAUTIONS

CEDOCARD® 10 should be administered with careful in acute myocardial infarction and glaucoma patients.

SIDE EFFECTS

Transient headaches.

CONTRAINDICATIONS

Hypotension, cardiac shock.
Hypersensitivity to isosorbide dinitrate.

ON DOCTOR'S PRESCRIPTION ONLY
Store at temperature below 30°C

PRESENTATION

Box of 60 tablets in 6 strips of 10 tablets
Reg. No. : DKL 9104506710B1

Manufactured by:

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Citeureup, Bogor, Indonesia

Marketed by:

Darya-Varia
LABORATORIA

Under license from:

Takeda
Takeda Nederland bv
Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp,
The Netherlands

PIN-00000000

160 mm

CEDOCARD® 10

Isosorbide Dinitrate 10 mg

Frutiger 65Bold_15.0pt

Frutiger 65Bold_12.0pt (80%)

Darya-Varia
LABORATORIA

Date : 30-09-2022

Note : re_design

Finishing :

Remark :

Product : INSERT CEDOCARD TAB 10 mg

Material : HVS 60 g

Dimensi : 70 x 160 mm

Color : ● Pantone Black C

Lipat 2x Horizontal

Roll Direction :

>Perubahan penulisan
Takeda Nederland bv
mengacu pada TD BPOM
September 2022

DISETUJUI OLEH BPOM : 26/10/2022
Drawing by : SNS / Pack.Dev QC DVL Citeureup Plant

ID : EREG10008712200106
EREG100087VR12200109