

FLUBIO®

Vaksin INFLUENZA HA

DESKRIPSI

Vaksin Influenza HA merupakan suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan (*slightly turbid*), mengandung haemagglutinin dari 3 jenis antigen virus influenza. Vaksin influenza HA berupa suspensi yang diberikan untuk injeksi.

Vaksin ini sesuai dengan rekomendasi WHO (Northern hemisphere) tahun 2007/2008.

KOMPOSISI

Tiap dosis (0.5 ml) mengandung strain:

A/Solomon Islands/3/2006 (IVR-145) (H1N1)	15 µg HA
A/Hiroshima/52/2005 (IVR-142) (H3N2)	15 µg HA
B/Malaysia/2506/2004	15 µg HA
Thimerosal	4 µg

INDIKASI

Vaksin direkomendasikan untuk pencegahan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus influenza pada orang yang beresiko tinggi.

CARA PEMBERIAN

Diberikan 0.5 ml per dosis secara intramuskular pada lengan bagian atas.

POSOLOGI

Vaksin influenza diberikan kepada orang sehat usia 12 tahun ke atas. Karena secara alami influenza bersifat musiman, pemberian vaksin direkomendasikan sekali dalam setahun.

EFEK SAMPING

Pada individu tertentu dapat menyebabkan:

Keluhan ringan, yang umumnya akan hilang setelah 1-2 hari tanpa pengobatan, seperti:

- Reaksi lokal : nyeri dan kemerahan pada lokasi suntikan.
- Reaksi sistemik : demam, nyeri otot, kelelahan.

Keluhan berat dan jarang terjadi, seperti:

- Reaksi Anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang mengakibatkan shock.
- Meskipun sangat jarang, resiko terjadinya sindroma Guillain-Barre dapat sedikit meningkat pada penerima imunisasi influenza dibandingkan dengan orang yang tidak diimunisasi, meskipun mekanismenya belum diketahui.

KONTRAINDIKASI

Vaksin TIDAK BOLEH DIGUNAKAN pada keadaan berikut:

- alergi telur, protein ayam atau konstituen vaksin.
- pada kasus demam tinggi, kejang-kejang, atau infeksi akut (vaksinasi harus ditunda)

INTERAKSI OBAT

Respon imunologi bisa tidak timbul pada pasien dalam pengobatan immunosupresan.

Untuk menghindari kemungkinan interaksi dengan beberapa produk obat, penggunaan obat lain hendaknya dikonsultasikan kepada dokter.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Vaksin harus dikocok sebelum digunakan untuk mendapatkan suspensi homogen.
- Diberikan dengan menggunakan alat suntik yang steril.
- Vaksin tidak boleh diberikan secara intravena dan pastikan jarum suntik tidak menusuk pembuluh darah.
- Vaksin jangan digunakan jika terjadi perubahan warna.

PENYIMPANAN

Simpan antara +2°C dan +8°C. Hindarkan dari sinar matahari langsung. **JANGAN DIBEKUKAN.**
Masa kadaluarsa selama 12 bulan.

KEMASAN

Dus isi 2 vial @ 0.5 ml (1 dosis); Reg No: DKL 0902906343A1

Dus isi 2 vial @ 2.5 ml (5 dosis); Reg No: DKL 0902906343A1

Harus Dengan Resep Dokter

BIOFARMA

Jl. Pasteur no. 28 – Bandung 40161 – Indonesia

PO Box 1136, Tel. +62 22 2033755, Fax. +62 22 2041306

www.biofarma.co.id