BROSUR
Package Insert

GIFLOX Tetes Mata Steril

Komposisi
Tiap mL mengandung:
Gatifloxacin..... ..... 3,00 mg

Cara Kerja
Gatifloxacin memiliki aktivitas antibakteri yang luas terhadap mikroorganisme gram negatif maupun mikroorganisme gram positif dengan jalan menghambat inhibisi DNA girase dan topoisomerase IV sehingga proses replikasi, transkripsi dan pembentukan DNA bakteri terganggu.

Indikasi
Untuk pengobatan infeksi ocular ekstemal seperti konjungtivitis dan keratitis bakterialis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap gatifloksasin seperti:
Bakteri aerob gram positif:
- *Corynebacterium propinquum*
- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus epidermidis*
- *Streptococcus mitis*
- *Streptococcus pneumoniae*

Bakteri aerob gram negative:
- *Haemophilus .influenzae*

Kontra indikasi
Hipersensitif terhadap antibiotik golongan quinolone atau kandungan lain dari obat ini.

Interaksi Obat
- Penggunaan bersamaan dengan teofilin dapat meningkatkan kadar teofilin dalam plasma
- Gangguan metabolisme kafein
- Meningkatkan efek antikoagulan **warfarin dan derivatnya**
- Meningkatkan kadar serum kreatinin **pada pasien pengguna** cyclosporine secara sistemik

Peringatan perhatian :
- Hanya untuk pemakaian luar
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan digunakan jika larutan berubah warna atau keruh.
- Untuk menghindari kontaminasi, jangan menyentuh ujung penetes.
- Hindarkan pemakaian yang lama karena dapat menyebabkan pertumbuhan organisme yang tidak sensitif, termasuk jamur yang dapat menimbulkan super infeksi
- Bila terjadi reaksi yang diperkirakan sebagai reaksi hipersensitif, maka pengobatan harus dihentikan
- Hentikan pemakaian obat jika terjadi reaksi sensitifitas
- Pasien yang memiliki gejala konjungtivitis bacterial tidak dianjurkan menggunakan lensa kontak selama masa pengobatan
- Penggunaan pada ibu hamil dan menyusui dalam pengawasan dokter
- Keamanan dan efektifitas pemakaian untuk anak-anak belum diketahui

- Pada pasien yang menerima kuinolon secara sistemik, termasuk gatifloksasin, pernah dilaporkan terjadi reaksi yang serius dan kadang-kadang fatal (anafilaktik), sebagian terjadi setelah pemakaian dosis pertama. Sebagian reaksi disertai oleh gagal jantung, kehilangan kesadaran, angiodema (termasuk edema wajah, laryngeal atau pharyngeal), penyumbatan jalur pernafasan, dispnea, urtikaria dan gatal-gatal.
- Jika reaksi alergi terhadap gatifloksasin terjadi, hentikan pemberian obat.
- Reaksi-reaksi hipersensitivitas akut yang serius membutuhkan tindakan darurat dengan segera. Pengaturan oksigen dan jalur pernafasan harus diterapkan sesuai petunjuk medis,

Efek samping
Efek samping yang sering terjadi adaiah iritasi konjungtival, peningkatan lakrimasi, keratitis dan konjungtivitis papilari. Reaksi ini terjadi pada 5 - 1 0 % pasien yang menggunakan gatifloxacin. Reaksi lain pernah dilaporkan terjadi pada 1 - 4% pasien adalah kemosis, konjungtival hemorrhage, mata kering, iritasi mata, eye pain, garis mata membengkak, pusing, mata merah, kemampuan penglihatan berkurang dan taste disturbance

Cara Pemakaian
Hari ke-I dan ke-2 : Teteskan 1 tetes pada mata yang sakit setiap 2 jam sampai 8 kali sehari (mulai bangun tidur).
Hari ke-3 sampai 7 : Teteskan 1 tetes pada mata yang sakit sampai 4 kali sehari (mulai bangun tidur)

Cara Penyimpanan
Simpan pada suhu dibawah 30°C, terlindung dari cahaya, tutup wadah rapat-rapat, hindari kontaminasi. Jangan dipergunakan 24 jam setelah dibuka.

Kemasan:
Larutan tetes mata, Catch cover 5 botol PE @ 0,6 ml.
No. Reg:

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Manufactured by:
PT. CENDO
BANDUNG -INDONESIA